



Durga Tutorial

Online Classes

बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड की तैयारी
Free Notes के लिए
www.durgatutorial.com
पर जाएँ।

ज्यादा जानकारी के लिए हमें
Social Media पर Follow करें।



https://www.facebook.com/durgatutorial23/?modal=admin_todo_tour



<https://twitter.com/DurgaTutorial>



<https://www.instagram.com/durgatutorial/>



<https://www.youtube.com/channel/UC5AJcz6Oizfohqj7eZvgeHQ>



9973735511

अध्याय-7

समाकलन

(Integrals)

(Important Formulae and Definitions)

$$1. \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, (n \neq -1)$$

$$2. \int \frac{1}{x} dx = \log_e |x| + c$$

$$3. \int e^x dx = e^x + c$$

$$4. \int a^x dx = \frac{a^x}{\log_e a} + c$$

$$5. \int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + c$$

$$7. \int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$8. \int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

$$9. \int \sec x \tan x dx = \sec x + c$$

Baniapur

$$10. \int \operatorname{cosec} x \cot x dx = -\operatorname{cosec} x + c$$

$$12. \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \tan^{-1} x + c$$

$$13. \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx = \sec^{-1} x + c$$

$$14. \int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{a(n+1)} + c$$


$$15. \int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \log |ax+b| + c$$

$$16. \int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + c$$

$$17. \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$18. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} \frac{x}{a} + c$$

$$19. \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-a^2}} dx = \frac{1}{a} \sec^{-1} \frac{x}{a} + c$$



20. $\int \tan x \, dx = -\log|\cos x| + c$ या $\log|\sec x| + c$

21. $\int \cot x \, dx = \log|\sin x| + c$

22. $\int \operatorname{cosec} x \, dx = \log\left|\tan \frac{x}{2}\right| + c = \log|\operatorname{cosec} x - \cot x| + c$

23. $\int \sec x \, dx = \log|\sec x + \tan x| + c = \log\left|\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right)\right| + c$

24. $\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a \sin bx - b \cos bx) + c$

25. $\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(b \sin bx + a \cos bx) + c$

26. $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{1}{2} \left[x\sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right] + c$

27. $\int \sqrt{a^2 + x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \log_e|x + \sqrt{a^2 + x^2}| + c$

28. $\int \sqrt{x^2 - a^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \log_e|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + c$

29. $\int \frac{1}{x^2 - a^2} \, dx = \frac{1}{2a} \log_e \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + c, \text{ जब } x > a$

30. $\int \frac{1}{a^2 - x^2} \, dx = \frac{1}{2a} \log_e \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + c, \text{ जब } x < a$

31. $\int \frac{dx}{ax^2 + bx + c} = \frac{2}{\sqrt{4ac - b^2}} \tan^{-1} \frac{2ax + b}{\sqrt{4ac - b^2}}, \text{ जब } 4ac > b^2$
 $= -\frac{1}{\sqrt{b^2 - 4ac}} \log_e \frac{2ax + b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2ax + b + \sqrt{b^2 - 4ac}}, \text{ जब } 4ac < b^2.$

प्रश्नावली 7.1

निम्नलिखित फलनों के प्रतिअवकलज (समाकलन) निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए :

प्रश्न 1. $\sin 2x$.

हल : हम जानते हैं कि

$$\frac{d}{dx} \cos 2x = -2 \sin 2x$$

$$\therefore -\frac{1}{2} \frac{d}{dx} \cos 2x = \sin 2x$$

$$\therefore \int \sin 2x \, dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\cos 3x$.

हल : हम जानते हैं कि

$$\frac{d}{dx} \sin 3x = 3 \cos 3x$$

$$\therefore \cos 3x = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3} \sin 3x \right)$$

$$\therefore \int \cos 3x \, dx = \frac{1}{3} \sin 3x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 3. e^{2x} .

हल : हम जानते हैं कि

$$\frac{d}{dx} e^{2x} = 2e^{2x}$$

$$e^{2x} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} e^{2x} \right)$$

$$\therefore \int e^{2x} \, dx = \frac{1}{2} e^{2x} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 4. $(ax + b)^2$.

हल : हम जानते हैं कि

$$\frac{d}{dx} (ax + b)^3 = 3a(ax + b)^2$$

$$(ax + b)^2 = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3a} (ax + b)^3 \right)$$

$$\therefore \int (ax + b)^2 \, dx = \frac{1}{3a} (ax + b)^3 + C.$$

उत्तर

प्रश्न 5. $\sin 2x - 4e^{3x}$

हल : हम जानते हैं कि

$$\frac{d}{dx} \cos 2x = -2 \sin 2x$$

$$\sin 2x = \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{2} \cos 2x \right)$$

$$\therefore \int \sin 2x \, dx = -\frac{1}{2} \cos 2x + C_1 \quad \dots(i)$$

और

$$\frac{d}{dx} (e^{3x}) = 3e^{3x} \text{ या } \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3} e^{3x} \right) = e^{3x}$$

$$\therefore \int e^{3x} \, dx = \frac{1}{3} e^{3x} + C_2 \quad \dots(ii)$$

समी. (i) तथा (ii) से,

$$\int (\sin 2x - 4e^{3x}) \, dx = -\frac{1}{2} \cos 2x - \frac{4}{3} e^{3x} + C \quad [\because C = C_1 + C_2] \text{ उत्तर}$$

निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए—

प्रश्न 6. $\int (4e^{3x} + 1) dx.$

हल :

$$\begin{aligned}\int (4e^{3x} + 1) dx &= 4 \int e^{3x} dx + \int dx \\ &= \frac{4}{3} e^{3x} + x + C.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 7. $\int x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx.$

हल :

$$\begin{aligned}\int x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) dx &= \int \left(x^2 - x^2 \cdot \frac{1}{x^2}\right) dx = \int (x^2 - 1) dx \\ &= \int x^2 dx - \int dx \\ &= \frac{x^3}{3} - x + C.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 8. $\int (ax^2 + bx + c) dx.$

हल :

$$\begin{aligned}\int (ax^2 + bx + c) dx &= a \int x^2 dx + b \int x dx + c \int dx \\ &= a \cdot \frac{x^3}{3} + b \cdot \frac{x^2}{2} + cx + C \\ &= \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx + C.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 9. $\int (2x^2 + e^x) dx.$

हल :

$$\begin{aligned}2 \int x^2 dx + \int e^x dx &= 2 \times \frac{x^3}{3} + e^x + c \\ &= \frac{2}{3} x^3 + e^x + c.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 10. $\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx.$

हल :

$$\begin{aligned}\int \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx &= \int \left[(\sqrt{x})^2 - 2\sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2\right] dx \\ &= \int \left(x - 2 + \frac{1}{x}\right) dx = \int x dx - 2 \int dx + \int \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^2}{2} - 2x + \log |x| + C.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 11. $\int \frac{x^3 + 5x^2 - 4}{x^2} dx.$

हल :

$$\begin{aligned}\int \frac{x^3 + 5x^2 - 4}{x^2} dx &= \int \left(\frac{x^3}{x^2} + \frac{5x^2}{x^2} - \frac{4}{x^2}\right) dx = \int \left(x + 5 - \frac{4}{x^2}\right) dx \\ &= \int x dx + 5 \int dx - 4 \int \frac{1}{x^2} dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int x \, dx + 5 \int dx - 4 \int x^{-2} \, dx \\
 &= \frac{x^2}{2} + 5x - \frac{4x^{-2+1}}{-2+1} + C \\
 &= \frac{x^2}{2} + 5x - \frac{4x^{-1}}{-1} + C \\
 &= \frac{x^2}{2} + 5x + \frac{4}{x} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 12. $\int \frac{x^3 + 3x + 4}{\sqrt{x}} \, dx.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^3 + 3x + 4}{\sqrt{x}} \, dx &= \int \left(\frac{x^3}{\sqrt{x}} + \frac{3x}{\sqrt{x}} + \frac{4}{\sqrt{x}} \right) dx \\
 &= \int (x^{\frac{5}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}} + 4x^{-\frac{1}{2}}) dx \\
 &= \int x^{\frac{5}{2}} \, dx + 3 \int x^{\frac{1}{2}} \, dx + 4 \int x^{-\frac{1}{2}} \, dx \\
 &= \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} + \frac{3x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + \frac{4x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \\
 &= \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + 3 \times \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + 4 \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C \\
 &= \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + 2x^{\frac{3}{2}} + 8\sqrt{x} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\int \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} \, dx.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x - 1} \, dx &= \int \frac{x^2(x - 1) + 1(x - 1)}{x - 1} \, dx \\
 &= \int \frac{(x - 1)(x^2 + 1)}{x - 1} \, dx = \int (x^2 + 1) \, dx \\
 &= \int x^2 \, dx + \int dx \\
 &= \frac{x^3}{3} + x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 14. $\int (1 - x)\sqrt{x} \, dx.$

हल :

$$\int (1 - x)\sqrt{x} \, dx = \int \left(x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}} \right) dx = \int x^{\frac{1}{2}} \, dx - \int x^{\frac{3}{2}} \, dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C \\
 &= \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 15. $\int \sqrt{x}(3x^2 + 2x + 3) dx.$

हल : $\int \sqrt{x}(3x^2 + 2x + 3) dx = \int (3x^{\frac{5}{2}} + 2x^{\frac{3}{2}} + 3x^{\frac{1}{2}}) dx$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \int x^{\frac{5}{2}} dx + 2 \int x^{\frac{3}{2}} dx + 3 \int x^{\frac{1}{2}} dx \\
 &= 3 \cdot \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} + 2 \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + 3 \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C \\
 &= 3 \times \frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}} + 2 \times \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + 3 \times \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C \\
 &= \frac{6}{7}x^{\frac{7}{2}} + \frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}} + 2x^{\frac{3}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 16. $\int (2x - 3 \cos x + e^x) dx.$

हल : $\int (2x - 3 \cos x + e^x) dx = 2 \int x dx - 3 \int \cos x dx + \int e^x dx$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \cdot \frac{x^2}{2} - 3 \sin x + e^x + C \\
 &= x^2 - 3 \sin x + e^x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 17. $\int (2x^2 - 3 \sin x + 5\sqrt{x}) dx.$

हल : $\int (2x^2 - 3 \sin x + 5\sqrt{x}) dx = 2 \int x^2 dx - 3 \int \sin x dx + 5 \int \sqrt{x} dx$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \times \frac{x^3}{3} - 3(-\cos x) + \frac{5x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C \\
 &= \frac{2}{3}x^3 + 3 \cos x + 5 \times \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + C \\
 &= \frac{2}{3}x^3 + 3 \cos x + \frac{10}{3}x^{\frac{3}{2}} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 18. $\int \sec x (\sec x + \tan x) dx.$

$$\begin{aligned} \text{हल : } \int \sec x (\sec x + \tan x) dx &= \int (\sec^2 x + \sec x \tan x) dx \\ &= \int \sec^2 x dx + \int \sec x \tan x dx \\ &= \tan x + \sec x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 19. $\int \frac{\sec^2 x}{\operatorname{cosec}^2 x} dx.$

$$\begin{aligned} \text{हल : } \int \frac{\sec^2 x}{\operatorname{cosec}^2 x} dx &= \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} = \int \tan^2 x dx \\ &= \int (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \sec^2 x dx - \int dx \\ &= \tan x - x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 20. $\int \frac{2 - 3 \sin x}{\cos^2 x} dx.$

$$\begin{aligned} \text{हल : } \int \frac{2 - 3 \sin x}{\cos^2 x} dx &= \int \frac{2}{\cos^2 x} dx - \int \frac{3 \sin x}{\cos^2 x} dx \\ &= 2 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - 3 \int \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} dx \\ &= 2 \int \sec^2 x dx - 3 \int \sec x \tan x dx \\ &= 2 \tan x - 3 \sec x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 21 व 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए —

प्रश्न 21. $\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ का प्रतिअवकलज है :

- | | |
|--|---|
| (A) $\frac{1}{3} x^{\frac{1}{3}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C$ | (B) $\frac{2}{3} x^{\frac{2}{3}} + \frac{1}{2} x^2 + C$ |
| (C) $\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + 2x^{\frac{1}{2}} + C$ | (D) $\frac{3}{2} x^{\frac{3}{2}} + \frac{1}{2} x^{\frac{1}{2}} + C$ |

हल :

$$\begin{aligned} \int \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx &= \int x^{1/2} dx + \int x^{-1/2} dx \\ &= \frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} + \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} + 2x^{1/2} + C \end{aligned}$$

अतः विकल्प (C) सही है।

उत्तर

प्रश्न 22. यदि $\frac{d}{dx} f(x) = 4x^3 - \frac{3}{x^4}$ जिसमें $f(2) = 0$ तो $f(x)$ है :

(A) $x^4 + \frac{1}{x^3} - \frac{129}{8}$

(B) $x^3 + \frac{1}{x^4} + \frac{129}{8}$

(C) $x^4 + \frac{1}{x^3} + \frac{129}{8}$

(D) $x^3 + \frac{1}{x^4} - \frac{129}{8}$

हल : ∵

$$\frac{d}{dx} f(x) = 4x^3 - \frac{3}{x^4}$$

या

$$\left(4x^3 - \frac{3}{x^4} \right) = f'(x) \text{ का प्रति अवकलज}$$

∴

$$\begin{aligned} f(x) &= \int \left(4x^3 - \frac{3}{x^4} \right) dx \\ &= 4 \int x^3 dx - 3 \int x^{-4} dx \\ &= 4 \times \frac{x^4}{4} - 3 \times \frac{x^{-3}}{-3} + C \\ f(x) &= x^4 + x^{-3} + C \end{aligned}$$

∴

(दिया है)

$$f(2) = (2)^4 + (2)^{-3} + C = 16 + \frac{1}{8} + C$$

$$\frac{129}{8} + C = 0 \text{ या } C = -\frac{129}{8}$$

∴

$$f(x) = x^4 + x^{-3} - \frac{129}{8}$$

$$f(x) = x^4 + \frac{1}{x^3} - \frac{129}{8}$$

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7.2

1 से 37 तक के प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए—

प्रश्न 1. $\frac{2x}{1+x^2} \cdot$

हल : $\int \frac{2x}{1+x^2} dx$

∴ $1+x^2 = t$ रखने पर

∴ $2x dx = dt$

अतः $\int \frac{2x}{1+x^2} dx = \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C$
 $= \log(1+x^2) + C$ (t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 2. $\frac{(\log x)^2}{x}$.

हल : $\int \frac{(\log x)^2}{x} dx$

$\therefore \log x = t$ रखने पर

$\therefore \frac{1}{x} dx = dt$

अतः $\int \frac{(\log x)^2}{x} dx = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C$
 $= \frac{1}{3} (\log x)^3 + C.$ (t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 3. $\frac{1}{x+x \log x}.$

हल : $\int \frac{1}{x+x \log x} dx = \int \frac{1}{x(1+\log x)} dx$

$\therefore 1+\log x = t$ प्रतिस्थापित करने पर

$\frac{1}{x} dx = dt$

अतः $\int \frac{1}{x(1+\log x)} dx = \int \frac{1}{t} dt = \log |t| + C$
 $= \log |1+\log x| + C.$ (t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 4. $\sin x \sin (\cos x).$

हल : $\int \sin x \sin (\cos x) dx$

$\therefore \cos x = t$ प्रतिस्थापित करने पर

$\therefore -\sin x dx = dt$

अतः $-\int \sin t dt = \cos t + C$
 $= \cos(\cos x) + C.$ (t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 5. $\sin(ax+b) \cos(ax+b).$

हल : $\int \sin(ax+b) \cos(ax+b) dx$

$\therefore \sin(ax+b) = t$ रखने पर

$\therefore a \cos(ax+b) dx = dt$

अतः $\int \sin(ax+b) \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \int t dt = \frac{1}{a} \cdot \frac{t^2}{2} + C$
 $= \frac{\sin^2(ax+b)}{2a} + C.$ (t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 6. $\sqrt{ax+b}$.

हल :

$$\int \sqrt{ax+b} dx$$

$\because ax+b = t$ प्रतिस्थापित करने पर

$$\therefore a dx = dt$$

अतः

$$\int \sqrt{ax+b} dx = \frac{1}{a} \int \sqrt{t} dt = \frac{1}{a} \int t^{1/2} dt$$

$$= \frac{1}{a} \left(\frac{\frac{1}{2}+1}{\frac{1}{2}+1} t^{\frac{1}{2}+1} \right) + C = \frac{2}{3a} t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3a} (ax+b)^{\frac{3}{2}} + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 7. $x\sqrt{x+2}$.

हल :

$$\int x\sqrt{x+2} dx$$

$$= \int (x+2-2).\sqrt{x+2} dx$$

$$= \int (x+2)^{\frac{3}{2}} dx - 2 \int \sqrt{x+2} dx$$

$$= \frac{(x+2)^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} - 2 \cdot \frac{(x+2)^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$$

Baniapur

$$= \frac{2}{5}(x+2)^{\frac{5}{2}} - \frac{4}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 8. $x\sqrt{1+2x^2}$.

हल :

$$\int x\sqrt{1+2x^2} dx$$

$\because 1+2x^2 = t$ रखने पर

$$4x dx = dt$$

\therefore

$$\int x\sqrt{1+2x^2} dx = \frac{1}{4} \int \sqrt{t} dt$$

$$= \frac{1}{4} \cdot \frac{t^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{1}{6} t^{\frac{3}{2}} + C$$

$$= \frac{1}{6} (1+2x^2)^{\frac{3}{2}} + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 9. $(4x + 2)\sqrt{x^2 + x + 1}.$

हल : $\int (4x + 2)\sqrt{x^2 + x + 1} dx = 2 \int (2x + 1)\sqrt{x^2 + x + 1} dx$

$\because x^2 + x + 1 = t$ रखने पर

$$\therefore (2x + 1) dx = dt$$

$$= 2 \int t^{\frac{1}{2}} dt = 2 \cdot \frac{t^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C$$

$$= \frac{4}{3} t^{\frac{3}{2}} + C = \frac{4}{3} (x^2 + x + 1)^{\frac{3}{2}} + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 10. $\frac{1}{x - \sqrt{x}}.$

हल :

$\because \sqrt{x} - 1 = t$ रखने पर

$$\therefore \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt$$

$$= 2 \int \frac{1}{t} dt = 2 \log |t| + C$$

$$= 2 \log |\sqrt{x} - 1| + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 11. $\frac{x}{\sqrt{x+4}}, x > 0.$

हल :

$$\int \frac{x}{\sqrt{x+4}} dx = \int \frac{x+4-4}{\sqrt{x+4}} dx$$

$$= \int \frac{x+4}{\sqrt{x+4}} dx - \int \frac{4}{\sqrt{x+4}} dx$$

$$= \int \sqrt{x+4} dx - 4 \int (x+4)^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \frac{2}{3} (x+4)^{\frac{3}{2}} - 4 \cdot 2(x+4)^{\frac{1}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{(x+4)} (x+4) - 8 \sqrt{(x+4)} + C$$

$$= 2\sqrt{(x+4)} \left(\frac{x+4}{3} - 4 \right) + C$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{x+4} (x+4 - 12) + C$$

$$= \frac{2}{3} \sqrt{x+4} (x-8) + C.$$

उत्तर

प्रश्न 12. $(x^3 - 1)^{\frac{1}{3}} x^5.$

हल : $\int (x^3 - 1)^{\frac{1}{3}} x^5 dx$

$$= \int (x^3 - 1)^{\frac{1}{3}} x^3 x^2 dx$$

$\because x^3 - 1 = t$ या $x^3 = 1 + t$ रखने पर

$$\therefore 3x^2 dx = dt$$

$$= \frac{1}{3} \int t^{\frac{1}{3}} (1+t) dt$$

$$= \frac{1}{3} \int (t^{\frac{1}{3}} + t^{\frac{4}{3}}) dt$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{t^{\frac{1}{3}+1}}{\frac{1}{3}+1} + \frac{t^{\frac{4}{3}+1}}{\frac{4}{3}+1} \right] + C$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{3}{4} t^{\frac{4}{3}} + \frac{3}{7} t^{\frac{7}{3}} \right] + C$$

$$= \frac{1}{4} t^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{7} t^{\frac{7}{3}} + C$$

$$= \frac{1}{4} (x^3 - 1)^{\frac{4}{3}} + \frac{1}{7} (x^3 - 1)^{\frac{7}{3}} + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 13. $\frac{x^2}{(2 + 3x^3)^3}.$

हल :

$$\int \frac{x^2}{(2 + 3x^3)^3} dx$$

$\therefore 2 + 3x^3 = t$ रखने पर

$$\therefore 9x^2 dx = dt$$

$$= \frac{1}{9} \int \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{9} \int t^{-3} dt$$

$$= \frac{1}{9} \left[\frac{t^{-3+1}}{-3+1} \right] + C$$

$$= -\frac{1}{18} \cdot \frac{1}{t^2} + C$$

$$= -\frac{1}{18(2 + 3x^3)^2} + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

Baniapur

प्रश्न 14. $\frac{1}{x(\log x)^m}, x > 0, m \neq 1.$

हल :

$$\int \frac{1}{x(\log x)^m} dx$$

$\because \log x = t$ रखने पर

$$\therefore \frac{1}{x} dx = dt$$

$$= \int \frac{1}{t^m} dt = \int t^{-m} dt = \frac{t^{-m+1}}{-m+1} + C$$

$$= \frac{(\log x)^{1-m}}{1-m} + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर}) \text{उत्तर}$$

प्रश्न 15. $\frac{x}{9 - 4x^2}.$

हल :

$\because 9 - 4x^2 = t$ रखने पर

$$\therefore -8x dx = dt$$

$$\int \frac{x}{9 - 4x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{8} \int \frac{dt}{t} = -\frac{1}{8} \log |t| + C$$

$$= \frac{1}{8} \log |t|^{-1} + C$$

$$= \frac{1}{8} \log \frac{1}{(9 - 4x^2)} + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर}) \text{उत्तर}$$

प्रश्न 16. $e^{2x+3}.$

हल :

$\because 2x + 3 = t$ रखने पर

$$\therefore 2dx = dt$$

$$\int e^{2x+3} dx$$

Baniapur

$$= \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^t + C$$

$$= \frac{1}{2} e^{2x+3} + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर}) \text{उत्तर}$$

प्रश्न 17. $\frac{x}{e^{x^2}}.$

हल :

$$\int \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$\because x^2 = t$ रखने पर

$$\therefore 2x dx = dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{e^t} = \frac{1}{2} \int e^{-t} dt = -\frac{1}{2} e^{-t} + C$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{e^{-x^2}}{2} + C \\
 &= -\frac{1}{2e^{x^2}} + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर) उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 18. $\frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2}.$

हल :

$$\because \tan^{-1} x = t \text{ रखने पर}$$

$$\therefore \frac{1}{1+x^2} dx = dt$$

$$= \int e^t dt = e^t + C = e^{\tan^{-1} x} + C.$$

(t का मान रखने पर) उत्तर

प्रश्न 19. $\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}.$

हल :

$$\begin{aligned}
 &\because e^x + e^{-x} = t \text{ रखने पर} \\
 &\therefore (e^x - e^{-x}) dx = dt
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} dx &= \int \frac{e^x(e^x - e^{-x})}{e^x(e^x + e^{-x})} dt \\
 &= \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx \\
 &= \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C \\
 &= \log(e^x + e^{-x}) + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर) उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 20. $\frac{e^{2x} - e^{-2x}}{e^{2x} + e^{-2x}}.$

हल :

$$\because e^{2x} + e^{-2x} = t \text{ रखने पर}$$

$$\therefore (2e^{2x} - 2e^{-2x}) dx = dt$$

$$\text{या } 2(e^{2x} - e^{-2x}) dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \log |t| + C \\
 &= \frac{1}{2} \log |e^{2x} + e^{-2x}| + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर) उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 21. $\tan^2(2x - 3).$

हल :

$$\int \tan^2(2x - 3) dx$$

$$= \int [\sec^2(2x-3) - 1] dx$$

$$= \int \sec^2(2x-3) dx - \int dx$$

$\because 2x-3 = t$ रखने पर
 $\therefore 2dx = dt$

$$= \frac{1}{2} \int \sec^2 t dt - \int dx = \frac{1}{2} \tan t - x + C$$

$$= \frac{1}{2} \tan(2x-3) - x + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर}) \text{ उत्तर}$$

प्रश्न 22. $\sec^2(7-4x)$.

हल : $\int \sec^2(7-4x) dx$

$\because 7-4x = t$ रखने पर
 $\therefore -4 dx = dt$

$$= -\frac{1}{4} \int \sec^2 t dt = -\frac{1}{4} \tan t + C$$

$$= -\frac{1}{4} \tan(7-4x) + C. \quad (t \text{ का मान रखने पर}) \text{ उत्तर}$$

प्रश्न 23. $\frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}.$

हल :

$\because \sin^{-1} x = t$ रखने पर

$$\therefore \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = dt$$

$$= \int t dt = \frac{t^2}{2} + C$$

$$= \frac{(\sin^{-1} x)^2}{2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 24. $\frac{2 \cos x - 3 \sin x}{6 \cos x + 4 \sin x}.$

हल : $\int \frac{2 \cos x - 3 \sin x}{6 \cos x + 4 \sin x} dx$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2 \cos x - 3 \sin x}{3 \cos x + 2 \sin x} dx$$

$\because 2 \sin x + 3 \cos x = t$ रखने पर
 $\therefore (2 \cos x - 3 \sin x) dx = dt$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \log |t| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log |2 \sin x + 3 \cos x| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 25. $\frac{1}{\cos^2 x(1 - \tan x)^2}.$

हल : $\int \frac{1}{\cos^2 x(1 - \tan x)^2} dx = \int \frac{\sec^2 x}{(1 - \tan x)^2} dx$

$\therefore 1 - \tan x = t$ रखने पर

$\therefore -\sec^2 x dx = dt$

$$\begin{aligned} &= - \int \frac{1}{t^2} dt = - \int t^{-2} dt = \frac{-t^{-2+1}}{-2+1} + C \\ &= -\frac{t^{-1}}{-1} + C = \frac{1}{t} + C \\ &= -\frac{1}{1 - \tan x} + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 26. $\frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}}.$

हल :

$\therefore \sqrt{x} = t$ रखने पर

$\therefore \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = dt$

\therefore

$$\begin{aligned} &\int \frac{\cos \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx \\ &= 2 \int \cos t dt = 2 \sin t + C \\ &= 2 \sin \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 27. $\sqrt{\sin 2x} \cos 2x.$

हल :

$\therefore \sin 2x = t$ रखने पर

$\therefore 2 \cos 2x dx = dt$

$\int \sqrt{\sin 2x} \cos 2x dx$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \sqrt{t} dt = \frac{1}{2} \times \frac{t^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{3} (\sin 2x)^{\frac{3}{2}} + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 28. $\frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin x}}.$

हल :

$\therefore \sin x = t$ रखने पर

$\therefore \cos x dx = dt$

$\int \frac{\cos x}{\sqrt{1 + \sin x}} dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{dt}{\sqrt{1+t}} = \frac{(1+t)^{\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C \\
 &= 2(1+t)^{\frac{1}{2}} + C \\
 &= 2\sqrt{(1+\sin x)} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 29. $\cot x \log \sin x$.

हल : $\int \cot x \log \sin x \, dx$

 $\because \log \sin x = t$ रखने पर, $\therefore \cot x \, dx = dt$

$$\begin{aligned}
 &= \int t \, dt = \frac{t^2}{2} + C \\
 &= \frac{1}{2} (\log \sin x)^2 + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 30. $\frac{\sin x}{1 + \cos x}$.

हल :

 $\because 1 + \cos x = t$ रखने पर $\therefore -\sin x \, dx = dt$

$$\begin{aligned}
 &\int \frac{\sin x}{1 + \cos x} \, dx \\
 &= - \int \frac{1}{t} \, dt = -\log |t| + C \\
 &= -\log |1 + \cos x| + C \\
 &= \log \left| \frac{1}{1 + \cos x} \right| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 31. $\frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2}$.

हल :

$$\int \frac{\sin x}{(1 + \cos x)^2} \, dx$$

 $\because 1 + \cos x = t$ रखने पर, $\therefore -\sin x \, dx = dt$

$$\begin{aligned}
 &= - \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{t^{-2+1}}{-2+1} + C = \frac{1}{t} + C \\
 &= \frac{1}{1 + \cos x} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 32. $\frac{1}{1 + \cot x}$.

हल :

$$\int \frac{1}{1 + \cot x} \, dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{1}{1 + \frac{\cos x}{\sin x}} dx \\
 &= \int \frac{1}{\frac{\sin x + \cos x}{\sin x}} dx \\
 &= \int \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \left(\frac{2 \sin x}{\sin x + \cos x} \right) dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{(\sin x + \cos x) - (\cos x - \sin x)}{\sin x + \cos x} dx \\
 &= \int \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x} dx
 \end{aligned}$$

$\because \sin x + \cos x = t$ रखने पर,

$$\therefore (\cos x - \sin x) dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t} dt \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \log |t| + C \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \log |\sin x + \cos x| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 33. $\frac{1}{1 - \tan x}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1}{1 - \tan x} dx &= \int \frac{1}{\frac{\sin x}{\cos x}} dx = \int \frac{1}{\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}} dx \\
 &= \int \frac{\cos x}{\cos x - \sin x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2 \cos x}{\cos x - \sin x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{\cos x - \sin x + \cos x + \sin x}{\cos x - \sin x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \frac{-\cos x - \sin x}{\cos x - \sin x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \frac{-\sin x - \cos x}{\cos x - \sin x} dx
 \end{aligned}$$

$\therefore \cos x - \sin x = t$ रखने पर,

$$\therefore (-\sin x - \cos x) dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \log |t| + C \\
 &= \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \log |\cos x - \sin x| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 34. $\frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x}.$

हल :

$$\begin{aligned}\int \frac{\sqrt{\tan x}}{\sin x \cos x} dx &= \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\frac{\sin x}{\cos x} \cos^2 x} dx \\ &= \int \frac{\sqrt{\tan x}}{\tan x} \sec^2 x dx = \int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{\tan x}} dx\end{aligned}$$

$\because \tan x = t$ रखने पर

$$\therefore \sec^2 x dx = dt$$

प्रश्न 35. $\frac{(1 + \log x)^2}{x}.$

हल :

$$\int \frac{(1 + \log x)^2}{x} dx$$

$\because 1 + \log x = t$ रखने पर,

$$\frac{1}{x} dx = dt$$

$$= \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C = \frac{1}{3}(1 + \log x)^3 + C.$$

उत्तर

उत्तर

प्रश्न 36. $\frac{(x+1)(x+\log x)^2}{x}.$

हल :

$$\int \frac{(x+1)(x+\log x)^2}{x} dx = \int \left(1 + \frac{1}{x}\right)(x+\log x)^2 dx$$

$\because x + \log x = t$ रखने पर,

$$\therefore \left(1 + \frac{1}{x}\right) dx = dt$$

$$= \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C = \frac{1}{3}(x + \log x)^3 + C.$$

उत्तर

प्रश्न 37. $\frac{x^3 \sin(\tan^{-1} x^4)}{1+x^8}.$

हल :

$$\int \frac{x^3 \sin(\tan^{-1} x^4)}{1+x^8} dx$$

$\because \tan^{-1} x^4 = t$ रखने पर,

$$\therefore \frac{1}{1+x^8} \frac{d}{dx} x^4 = dt$$

या

$$\frac{4x^3}{1+x^8} dx = dt$$

या

$$\frac{x^3}{1+x^8} dx = \frac{1}{4} dt$$

$$= \frac{1}{4} \int \sin t \, dt$$

$$= \frac{1}{4} (-\cos t) + C$$

$$= -\frac{1}{4} \cos (\tan^{-1} x^4) + C.$$

उत्तर

प्रश्न 38 एवं 39 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 38. $\int \frac{10x^9 + 10^x \log_e 10}{x^{10} + 10^x} dx$ बराबर है—

(A) $10^x - x^{10} + C$

(C) $(10^x - x^{10})^{-1} + C$

(B) $10^x + x^{10} + C$

(D) $\log(10^x + x^{10}) + C$

हल :

$$\int \frac{10x^9 + 10^x \log_e 10}{x^{10} + 10^x} dx$$

$\therefore x^{10} + 10^x = t$ रखने पर

$\therefore (10x^9 + 10^x \log_e 10) dx = dt$

Baniapur

$$= \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C$$

$$= \log |x^{10} + 10^x| + C$$

अतः विकल्प (D) सही है।

उत्तर

प्रश्न 39. $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ बराबर है—

(A) $\tan x + \cot x + C$

(C) $\tan x \cot x + C$

(B) $\tan x - \cot x + C$

(D) $\tan x - \cot 2x + C$

हल :

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{(\sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$$

$$= \int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx + \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$$

$$= \int \sec^2 x dx + \int \operatorname{cosec}^2 x dx$$

$$= \tan x - \cot x + C.$$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7·3

1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए—

प्रश्न 1. $\sin^2(2x + 5)$.

$$\text{हल : } \int \sin^2(2x + 5) dx \quad \left(\because \sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \int [1 - \cos 2(2x + 5)] dx$$

$$= \frac{1}{2} \int [1 - \cos (4x + 10)] dx$$

यहाँ $4x + 10 = t$ रखने पर

$$4dx = dt$$

$$= \frac{1}{2} \int 1 dx - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \int \cos t dt$$

$$= \frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin t + C$$

$$= \frac{1}{2} x - \frac{1}{8} \sin (4x + 10) + C.$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\sin 3x \cos 4x$.

$$\text{हल : } \int \sin 3x \cos 4x dx = \frac{1}{2} \int 2 \cos 4x \sin 3x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \sin 7x - \sin x dx$$

[$\because 2 \cos A \sin B = \sin (A + B) - \sin (A - B)$]

$$= \frac{1}{2} \int \sin 7x dx - \frac{1}{2} \int \sin x dx$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{\cos 7x}{7} \right) + \frac{1}{2} (\cos x) + C$$

$$= -\frac{1}{14} \cos 7x + \frac{1}{2} \cos x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\cos 2x \cos 4x \cos 6x$.

$$\text{हल : } \int \cos 2x \cos 4x \cos 6x dx = \frac{1}{2} \int (2 \cos 4x \cos 2x) \cos 6x dx$$

$$= \frac{1}{2} \int [\cos 6x + \cos 2x] \cos 6x dx$$

[$\because 2 \cos A \cos B = \cos (A + B) - \cos (A - B)$]

$$= \frac{1}{4} \int (2 \cos^2 6x + 2 \cos 6x \cos 2x) dx$$

$$= \frac{1}{4} \int [1 + \cos 12x + \cos 8x + \cos 4x] dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} \left[\int 1 dx + \int \cos 12x dx + \int \cos 8x dx + \int \cos 4x dx \right] \\
 &= \frac{1}{4} \left[x + \frac{\sin 12x}{12} + \frac{\sin 8x}{8} + \frac{\sin 4x}{4} \right] + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 4. $\sin^3(2x+1)$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \sin^3(2x+1) dx &= \int \sin^2(2x+1) \cdot \sin(2x+1) dx \\
 &= \int [1 - \cos^2(2x+1)] \cdot \sin(2x+1) dx
 \end{aligned}$$

मान लीजिए $\cos(2x+1) = t$

$$-\sin(2x+1)2dx = dt$$

या $\sin(2x+1) dx = \frac{dt}{2}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-1}{2} \int (1-t^2) dt \\
 &= \frac{-1}{2} \left[\int 1 dt - \int t^2 dt \right] \\
 &= \frac{-1}{2} \left[t - \frac{t^3}{3} \right] + C \\
 &= \frac{-t}{2} + \frac{t^3}{6} + C \\
 &= \frac{-\cos(2x+1)}{2} + \frac{\cos^3(2x+1)}{6} + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 5. $\sin^3 x \cos^3 x$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \sin^3 x \cos^3 x dx &= \int \sin^2 x \cos^3 x \sin x dx \\
 &= \int (1 - \cos^2 x) \cos^3 x \sin x dx
 \end{aligned}$$

$\because \cos x = t$ रखने पर

$$\therefore -\sin x dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= - \int (1-t^2)t^3 dt = - \int (t^3 - t^5) dt \\
 &= -\frac{t^4}{4} + \frac{t^6}{6} + C \\
 &= \frac{1}{6} \cos^6 x - \frac{1}{4} \cos^4 x + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 6. $\sin x \sin 2x \sin 3x$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int (\sin x \sin 2x \sin 3x) dx &= \frac{1}{2} \int (2 \sin x \sin 2x) \sin 3x dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int (\cos x - \cos 3x) \sin 3x \, dx \\
 &\quad [\because 2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)] \\
 &= \frac{1}{4} \int [2 \sin 3x \cos x - 2 \sin 3x \cos 3x] \, dx \\
 &= \frac{1}{4} \int [\sin 4x + \sin 2x - \sin 6x] \, dx \\
 &\quad [\because 2 \sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)] \\
 &= -\frac{1}{4} \left[\frac{\cos 4x}{4} + \frac{\cos 2x}{2} - \frac{\cos 6x}{6} \right] + C \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{\cos 6x}{6} - \frac{\cos 4x}{4} - \frac{\cos 2x}{2} \right) + C. \tag*{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 7. $\sin 4x \sin 8x$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \sin 4x \sin 8x \, dx &= \frac{1}{2} \int (2 \sin 8x \sin 4x) \, dx \\
 &\quad [\because 2 \sin A \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)] \\
 &= \frac{1}{2} \int [\cos 4x - \cos 12x] \, dx \\
 &= \frac{1}{2} \left[\int \cos 4x \, dx - \int \cos 12x \, dx \right] \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4} \sin 4x - \frac{1}{12} \sin 12x \right] + C. \tag*{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 8. $\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} \, dx &= \int \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} \, dx \\
 &\quad [\because 1 - \cos A = 2 \sin^2 \frac{A}{2}, 1 + \cos A = 2 \cos^2 \frac{A}{2}] \\
 &= \int \tan^2 \frac{x}{2} \, dx = \int \left(\sec^2 \frac{x}{2} - 1 \right) \, dx \\
 &= \int \sec^2 \frac{x}{2} \, dx - \int 1 \cdot dx \\
 &= \frac{\tan \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} - x + C \\
 &= 2 \tan \frac{x}{2} - x + C. \tag*{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 9. $\frac{\cos x}{1 + \cos x}.$

हल :

$$\begin{aligned}\int \frac{\cos x}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{1 + \cos x - 1}{1 + \cos x} dx \\&= \int \frac{1 + \cos x}{1 + \cos x} dx - \int \frac{1}{1 + \cos x} dx \\&= \int \left(1 - \frac{1}{1 + \cos x}\right) dx = \int \left(1 - \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}\right) dx \\&\quad [\because 1 + \cos 2A = 2 \cos^2 A]\end{aligned}$$

$$= \int \left(1 - \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2}\right) dx = \int 1 dx - \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx$$

$$= x - \frac{1}{2} \cdot \frac{\tan \frac{x}{2}}{\frac{1}{2}} + C = x - \tan \frac{x}{2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 10. $\sin^4 x.$

हल :

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x dx &= \int (\sin^2 x)^2 dx \\&= \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 dx \quad \left[\because \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}\right] \\&= \frac{1}{4} \int (1 - 2 \cos 2x + \cos^2 2x) dx\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2}\right) dx \\&\quad \left[\because \cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2}\right]\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{8} \int (2 - 4 \cos 2x + \cos 4x + 1) dx$$

$$= \frac{1}{8} \int (3 - 4 \cos 2x + \cos 4x) dx$$

$$= \frac{1}{8} \left[\int 3 dx - 4 \int \cos 2x dx + \int \cos 4x dx \right]$$

$$= \frac{1}{8} \left[3x - 4 \cdot \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 4x}{4} \right] + C$$

$$= \frac{3}{8} x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 11. $\cos^4 2x.$

हल :

$$\int \cos^4 2x dx = \int (\cos^2 2x)^2 dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} \right)^2 dx \quad \left(\because \cos^2 A = \frac{1 + \cos 2A}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \int (1 + 2 \cos 4x + \cos^2 4x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 + 2 \cos 4x + \frac{1 + \cos 8x}{2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{(2 + 4 \cos 4x + 1 + \cos 8x)}{2} dx \\
 &= \frac{1}{8} \int (3 + 4 \cos 4x + \cos 8x) dx \\
 &= \frac{1}{8} \left[\int 3 dx + 4 \int \cos 4x dx + \int \cos 8x dx \right] \\
 &= \frac{1}{8} \left(3x + \frac{4 \sin 4x}{4} + \frac{\sin 8x}{8} \right) + C \\
 &= \frac{3}{8}x + \frac{1}{8} \sin 4x + \frac{1}{64} \sin 8x + C
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 12. $\frac{\sin^2 x}{1 + \cos x}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{1 - \cos^2 x}{1 + \cos x} dx \\
 &= \int \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)} dx \\
 &= \int (1 - \cos x) dx = x - \sin x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\frac{\cos 2x - \cos 2\alpha}{\cos x - \cos \alpha}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos 2x - \cos 2\alpha}{\cos x - \cos \alpha} dx &= \int \frac{(2 \cos^2 x - 1) - (2 \cos^2 \alpha - 1)}{\cos x - \cos \alpha} dx \\
 &= \int \frac{2(\cos^2 x - \cos^2 \alpha)}{\cos x - \cos \alpha} dx \\
 &= 2 \int \frac{(\cos x + \cos \alpha)(\cos x - \cos \alpha)}{\cos x - \cos \alpha} dx \\
 &= 2 \int (\cos x + \cos \alpha) dx \\
 &= 2 \left[\int \cos x dx + \cos \alpha \int 1 dx \right] \\
 &= 2(\sin x + x \cos \alpha) + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 14. $\frac{\cos x - \sin x}{1 + \sin 2x}$.

हल : माना

$$I = \int \frac{\cos x - \sin x}{1 + \sin 2x} dx$$

∴
और

$$1 = \cos^2 x + \sin^2 x$$

$$\sin 2x = 2 \cos x \sin x$$

$$= \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos^2 x + \sin^2 x + 2 \cos x \sin x} dx$$

$$= \int \frac{\cos x - \sin x}{(\cos x + \sin x)^2} dx$$

माना $\cos x + \sin x = t$ रखने पर
 $(-\sin x + \cos x) dx = dt$

$$\therefore I = \int \frac{dt}{t^2} = \int t^{-2} dt = \frac{t^{-2+1}}{-2+1} + C$$

$$= -\frac{1}{t} + C = -\frac{1}{\cos x + \sin x} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 15. $\tan^3 2x \sec 2x$.

हल :

$$\int \tan^3 2x \sec 2x dx = \int \tan^2 2x \sec 2x \tan 2x dx$$

$$= \int (\sec^2 2x - 1) \sec 2x \tan 2x dx$$

∴ $\sec 2x = t$ रखने पर
 $\therefore 2 \sec 2x \tan 2x dt = dt$

या $\sec 2x \tan 2x = \frac{1}{2} dt$

$$= \frac{1}{2} \int (t^2 - 1) dt$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{t^3}{3} - t \right) + C$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} \sec^3 2x - \sec 2x \right) + C$$

$$= \frac{1}{6} \sec^3 2x - \frac{1}{2} \sec 2x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 16. $\tan^4 x$.

हल :

$$\int \tan^4 x dx = \int \tan^2 x \cdot \tan^2 x dx$$

$$= \int \tan^2 x (\sec^2 x - 1) dx$$

$$= \int \tan^2 x \sec^2 x dx - \int \tan^2 x dx$$

$$= \int \tan^2 x \sec^2 x dx - \int (\sec^2 x - 1) dx$$

∴ $\tan x = t$ रखने पर

∴

$$\sec^2 x dx = dt$$

$$= \int t^2 dt - \int 1 dt + \int 1 dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{t^3}{3} - t + x + C \\
 &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 17. $\frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\sin^3 x + \cos^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx &= \int \frac{\sin^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx + \int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx \\
 &= \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx + \int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx \\
 &= \int \sec x \tan x dx + \int \operatorname{cosec} x \cot x dx \\
 &= \sec x - \operatorname{cosec} x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 18. $\frac{\cos 2x + 2 \sin^2 x}{\cos^2 x}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{\cos 2x + 2 \sin^2 x}{\cos^2 x} dx &= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x + 2 \sin^2 x}{\cos^2 x} dx \\
 &\quad [\because \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x] \\
 &= \int \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} dx \\
 &= \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \int \sec^2 x dx \\
 &= \tan x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 19. $\frac{1}{\sin x \cos^3 x}$.

Baniapur

हल :

$$\int \frac{1}{\sin x \cos^3 x} dx = \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos^3 x} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \left(\frac{\sin^2 x}{\sin x \cos^3 x} + \frac{\cos^2 x}{\sin x \cos^3 x} \right) dx \\
 &= \int \left(\frac{\tan x}{\cos^2 x} + \frac{1}{\tan x \cdot \cos^2 x} \right) dx \\
 &= \int \left(\tan x \sec^2 x + \frac{1}{\tan x} \sec^2 x \right) dx
 \end{aligned}$$

अब $\tan x = t$ रखने पर

$$\sec^2 x dx = dt$$

$$I = \int \left(t + \frac{1}{t} \right) dt = \frac{t^2}{2} + \log |x| + C$$

$$= \frac{1}{2} \tan^2 x + \log |\tan x| + C$$

$$= \log |\tan x| + \frac{1}{2} \tan^2 x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 20. $\frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2}.$

हल :

$$\begin{aligned} \int \frac{\cos 2x}{(\cos x + \sin x)^2} dx &= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{(\cos x + \sin x)^2} dx \\ &= \int \frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2} dx \\ &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx \\ \because \cos x + \sin x &= t \text{ रखने पर,} \\ \therefore (-\sin x + \cos x) dx &= dt \\ &= \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C \\ &= \log |\cos x + \sin x| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 21. $\sin^{-1}(\cos x).$

हल :

$$\begin{aligned} \int \sin^{-1}(\cos x) dx &= \int \sin^{-1}\left(\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right) dx \\ &= \int \left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx = \frac{\pi}{2}x - \frac{x^2}{2} + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 22. $\frac{1}{\cos(x-a)\cos(x-b)}.$

हल :

$$\int \frac{1}{\cos(x-a)\cos(x-b)} dx$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin(a-b)}{\cos(x-a)\cos(x-b)} dx \\ &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin[(x-b)-(x-a)]}{\cos(x-a)\cos(x-b)} dx \\ &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin(x-b)\cos(x-a) - \cos(x-b)\sin(x-a)}{\cos(x-a)\cos(x-b)} dx \\ &\quad [\because \sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sin(a-b)} \int [\tan(x-b) - \tan(x-a)] dx$$

$$= \frac{1}{\sin(a-b)} [-\log |\cos(x-b)| + \log |\cos(x-a)|] + C$$

$$= \frac{1}{\sin(a-b)} \log \left| \frac{\cos(x-a)}{\cos(x-b)} \right| + C.$$

उत्तर

Baniapur

प्रश्न 23 एवं 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 23. $\int \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$ बराबर है—

- (A) $\tan x + \cot x + C$
 (C) $-\tan x + \cot x + C$
- (B) $\tan x + \operatorname{cosec} x + C$
 (D) $\tan x + \sec x + C$

हल :
$$\int \frac{\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx - \int \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$$

$$= \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \frac{dx}{\sin^2 x}$$

$$= \int \sec^2 x dx - \int \operatorname{cosec}^2 x dx$$

$$= \tan x + \cot x + C.$$

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्न 24. $\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(e^x x)} dx$ बराबर है—

- (A) $-\cot(e^x x) + C$
 (C) $\tan(e^x) + C$

- (B) $\tan(x e^x) + C$
 (D) $\cot(e^x) + C$

हल :

$$\int \frac{e^x(1+x)}{\cos^2(e^x x)} dx = \int \frac{(e^x + x e^x) dx}{\cos^2(e^x x)}$$

$$\begin{aligned} \text{मान लीजिए } xe^x &= t \\ \Rightarrow (e^x + x e^x) dx &= dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{dt}{\cos^2 t} = \int \sec^2 t dt \\ &\equiv \tan t + C \\ &= \tan(x e^x) + C \end{aligned}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7.4

प्रश्न 1 से 23 तक के फलनों का समाकलन कीजिए—

प्रश्न 1. $\frac{3x^2}{x^6 + 1} \cdot$

हल :

$$\therefore x^3 = t \text{ रखने पर,}$$

\therefore

$$\int \frac{3x^2}{x^6 + 1} dx$$

$$3x^2 dx = dt$$

$$= \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \tan^{-1} t + C = \tan^{-1} x^3 + C.$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} \cdot$

हल :

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+4x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{1+(2x)^2}} dx$$

यहाँ $2x = \tan \theta$ लेने पर,
 $\therefore 2dx = \sec^2 \theta d\theta$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2 \theta}} \sec^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{\sec^2 \theta}{\sec \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int \sec \theta d\theta = \frac{1}{2} \log |\sec \theta \tan \theta| + C \\ &= \frac{1}{2} \log \left| \sqrt{1+4x^2} + 2x \right| + C \quad [\because \sec \theta = \sqrt{1+4x^2}] \\ &= \frac{1}{2} \log \left| 2x + \sqrt{1+4x^2} \right| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\int \frac{1}{\sqrt{(2-x)^2 + 1}} dx$.

हल :

यहाँ $2-x = t$ रखने पर
 $\therefore -dx = dt$

$$\begin{aligned} &\int \frac{1}{\sqrt{(2-x)^2 + 1}} dx \\ &= - \int \frac{dx}{\sqrt{t^2 + 1}} = - \log |t + \sqrt{t^2 + 1}| + C \\ &= - \log |(2-x) + \sqrt{(2-x)^2 + 1}| + C \\ &= \log \left| \frac{1}{(2-x) + \sqrt{(2-x)^2 + 1}} \right| + C \\ &= \log \left| \frac{1}{2-x + \sqrt{x^2 - 4x + 5}} \right| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 4. $\int \frac{1}{\sqrt{9-25x^2}} dx$.

हल :

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{9-25x^2}} &= \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{9}{25}-x^2}} = \frac{1}{5} \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{3}{5}\right)^2-x^2}} \\ &\quad \left[\because \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} \right] \\ &= \frac{1}{5} \sin^{-1} \left[\frac{x}{\frac{3}{5}} \right] + C = \frac{1}{5} \sin^{-1} \left(\frac{5x}{3} \right) + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 5. $\frac{3x}{1+2x^4}.$

हल :

$$\because x^2 = t \text{ रखने पर,}$$

$$\therefore 2x dx = dt$$

$$\int \frac{3x}{1+2x^4} dx = \int \frac{3x}{1+2(x^2)^2} dx$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \int \frac{2x}{1+2(x^2)^2} dx = \frac{3}{2} \int \frac{dt}{1+2t^2}$$

$$= \frac{3}{2} \int \frac{dt}{\frac{1}{2} + t^2} = \frac{3}{2} \int \frac{dt}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + t^2}$$

$$= \frac{3}{4} \sqrt{2} \tan^{-1} \left(\frac{t}{\frac{1}{\sqrt{2}}} \right) + C$$

$$\left[\because \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right]$$

$$= \frac{3}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{2}t}{1} \right) + C$$

$$= \frac{3}{2\sqrt{2}} \tan^{-1} (\sqrt{2}x^2) + C.$$

उत्तर

प्रश्न 6. $\frac{x^2}{1-x^6}.$

हल :

$$\because x^3 = t \text{ रखने पर,}$$

$$\therefore 3x^2 dx = dt$$

$$\int \frac{x^2}{1-x^6} dx = \int \frac{x^2 dx}{1-(x^3)^2}$$

$$= \frac{1}{3} \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \log \frac{1+t}{1-t} + C$$

$$= \frac{1}{6} \log \left(\frac{1+x^3}{1-x^3} \right) + C.$$

उत्तर

प्रश्न 7. $\frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}}.$

हल :

$$\begin{aligned} \int \frac{x-1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx - \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-1}} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}} dx - \log(x + \sqrt{x^2-1}) \end{aligned}$$

$$\because x^2 - 1 = t \text{ रखने पर}$$

$$\therefore 2x dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} - \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) \\
 &= \frac{1}{2} \left[\frac{t^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}} \right] - \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C \\
 &= t^{\frac{1}{2}} - \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C \\
 &= \sqrt{x^2 - 1} - \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 8. $\frac{x^2}{\sqrt{x^6 + a^6}}.$

हल :

$$\because x^3 = t \text{ रखने पर,}$$

$$\therefore 3x^2 dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^6 + a^6}} &= \int \frac{x^2 dx}{(x^3)^2 + a^6} \\
 &= \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + a^6}} = \frac{1}{3} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + (a^3)^2}} \\
 &\stackrel{\text{Since } t = x^3}{=} \frac{1}{3} \log \left| t + \sqrt{t^2 + (a^3)^2} \right|
 \end{aligned}$$

Baniapur [$\because \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx = \log(x + \sqrt{x^2 + a^2})$]

$$= \frac{1}{3} \log \left| x^3 + \sqrt{x^6 + a^6} \right| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 9. $\frac{\sec^2 x}{\sqrt{\tan^2 x + 4}}.$

हल :

$$\text{यहाँ } \tan x = t \text{ रखने पर,}$$

 \therefore

$$\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{\tan^2 x + 4}} dx$$

$$\sec^2 x dx = dt$$

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + 4}} = \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + (2)^2}}$$

[$\because \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + a^2}} dx = \log(t + \sqrt{t^2 + a^2})$]

$$= \log \left| t + \sqrt{t^2 + 4} \right| + C$$

$$= \log \left| \tan x + \sqrt{\tan^2 x + 4} \right| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 10. $\frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}}.$

हल :
$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 2x + 2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{(x+1)^2 + 1}} dx \\ &= \log \left| (x+1) + \sqrt{(x+1)^2 + 1} \right| + C \\ \therefore &= \log \left| (x+1) + \sqrt{x^2 + 2x + 2} \right| + C. \end{aligned}$$
 उत्तर

प्रश्न 11. $\frac{1}{9x^2 + 6x + 5}.$

हल :
$$\begin{aligned} \int \frac{1}{9x^2 + 6x + 5} dx &= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{5}{9}} \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\left(x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}\right) + \frac{5}{9} - \frac{1}{9}} \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{4}{9}} \\ &= \frac{1}{9} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} \quad \left[\because \int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right] \\ &= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)} \tan^{-1} \frac{x + \frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} + C \\ &= \frac{1}{6} \tan^{-1} \left(\frac{3x+1}{2} \right) + C. \end{aligned}$$
 उत्तर

प्रश्न 12. $\frac{1}{\sqrt{7 - 6x - x^2}}.$

हल :
$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\sqrt{7 - 6x - x^2}} dx &= \int \frac{dx}{\sqrt{7 - (x^2 + 6x)}} \\ &= \int \frac{dx}{\sqrt{7 - (x^2 + 6x + 9) + 9}} \\ &= \int \frac{dx}{\sqrt{16 - (x+3)^2}} \quad \left[\because \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} \right] \\ &= \sin^{-1} \left(\frac{x+3}{4} \right) + C. \end{aligned}$$
 उत्तर

प्रश्न 13. $\frac{1}{\sqrt{(x-1)(x-2)}}.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-2)}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right) + 2 - \frac{9}{4}}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}} \\
 &= \log \left| \left(x - \frac{3}{2}\right) + \sqrt{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} \right| + C \\
 &= \log \left| \frac{2x-3}{2} + \sqrt{x^2 - 3x + 2} \right| + C \\
 &= \log \left| x - \frac{3}{2} + \sqrt{x^2 - 3x + 2} \right| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 14. $\frac{1}{\sqrt{8+3x-x^2}}.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{8+3x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{8-(x^2-3x)}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{8-\left(x^2-3x+\frac{9}{4}\right)+\frac{9}{4}}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{41}{4}-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{41}}{2}\right)^2-\left(x-\frac{3}{2}\right)^2}} \\
 &\quad \left[\because \int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \sin^{-1} \frac{x}{a} \right] \\
 &= \sin^{-1} \left(\frac{x-\frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{41}}{2}} \right) + C = \sin^{-1} \frac{2x-3}{\sqrt{41}} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 15. $\frac{1}{\sqrt{(x-a)(x-b)}}.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(x-b)}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - (a+b)x + ab}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - (a+b)x + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + ab}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + ab}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2}} \\
 &\quad \left[\because \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \log [x + \sqrt{x^2 - a^2}] \right] \\
 &= \log \left(x - \frac{a+b}{2} + \sqrt{\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 - \left(\frac{a-b}{2}\right)^2} \right) + C \\
 &= \log \left| x - \frac{a+b}{2} + \sqrt{x^2 - (a+b)x + ab} \right| + C \\
 &= \log \left| x - \frac{a+b}{2} + \sqrt{(x-a)(x-b)} \right| + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 16. $\frac{4x+1}{\sqrt{2x^2+x-3}}.$

हल :

$$\int \frac{4x+1}{\sqrt{2x^2+x-3}} dx$$

$\therefore 2x^2 + x - 3 = t$ रखने पर,

$$\therefore (4x+1) dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = 2\sqrt{t} + C \\
 &= 2\sqrt{2x^2+x-3} + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 17. $\frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}}.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+2}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \int \frac{x}{\sqrt{x^2-1}} dx + \int \frac{2}{\sqrt{x^2-1}} dx \\
 &= I_1 + I_2 \quad (\text{मान लीजिए})
 \end{aligned}$$

$$I_1 = \frac{1}{2} \int \frac{2x \, dx}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

I_1 में $x^2 - 1 = t$ रखने पर
 $2x \, dx = dt$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} \\ &= \sqrt{t} = \sqrt{x^2 - 1} \end{aligned}$$

तथा

$$I_2 = 2 \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \, dx = 2 \log |x + \sqrt{x^2 - 1}|$$

$$\therefore I_1 + I_2 = \sqrt{x^2 - 1} + 2 \log |x + \sqrt{x^2 - 1}| + C. \quad \text{उत्तर}$$

प्रश्न 18. $\int \frac{5x - 2}{1 + 2x + 3x^2} \, dx$.

हल :

$$\int \frac{5x - 2}{1 + 2x + 3x^2} \, dx$$

अब

$$\begin{aligned} 5x - 2 &= A \frac{d}{dx}(1 + 2x + 3x^2) + B \\ &= A(2 + 6x) + B = 6Ax + (2A + B) \end{aligned}$$

x तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर

$$5 = 6A \quad \text{या} \quad A = \frac{5}{6}$$

$$2A + B = -2 \quad \text{या} \quad B = -2 - 2A = -2 - 2 \times \frac{5}{6}$$

$$B = -2 - \frac{5}{3} = -\frac{11}{3}$$

Banjapur

$$= \int \frac{\frac{5}{6}(2 + 6x) - \frac{11}{3}}{1 + 2x + 3x^2} \, dx$$

$$= \frac{5}{6} \int \frac{2 + 6x}{1 + 2x + 3x^2} \, dx - \frac{11}{3} \int \frac{dx}{1 + 2x + 3x^2}$$

$$= I_1 - \frac{11}{3} I_2 \quad (\text{मान लीजिए}) \quad \dots(i)$$

$$\therefore I_1 = \frac{5}{6} \int \frac{2 + 6x}{1 + 2x + 3x^2} \, dx \quad \text{माना } 1 + 2x + 3x^2 = t$$

$$\therefore (2 + 6x) \, dx = dt$$

$$= \frac{5}{6} \int \frac{dt}{t} = \frac{5}{6} \log |t|$$

$$= \frac{5}{6} \log |1 + 2x + 3x^2| \quad \dots(ii)$$

तथा

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int \frac{dx}{1+2x+3x^2} \\
 &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\frac{1}{3} + \frac{2}{3}x + x^2} \\
 &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\left(x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}\right) + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}} \\
 &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{2}{9}} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{x + \frac{1}{3}}{\frac{\sqrt{2}}{3}} \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{3x + 1}{\sqrt{2}} \right) \quad \dots(iii)
 \end{aligned}$$

समी. (ii) और (iii) का मान समी. (i) में रखने पर

$$\begin{aligned}
 &= \frac{5}{6} \log |1+2x+3x^2| - \frac{11}{3} \times \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{3x+1}{\sqrt{2}} \right) + C \\
 &= \frac{5}{6} \log |1+2x+3x^2| - \frac{11}{3\sqrt{2}} \tan^{-1} \left(\frac{3x+1}{\sqrt{2}} \right) + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 19. $\frac{6x+7}{\sqrt{(x-5)(x-4)}}.$

हल : $\int \frac{6x+7}{\sqrt{(x-5)(x-4)}} dx = \int \frac{6x+7}{\sqrt{x^2 - 9x + 20}} dx$

अब

$$6x+7 = A \frac{d}{dx}(x^2 - 9x + 20) + B = A(2x - 9) + B$$

 x के गुणांक तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर

$$\begin{aligned}
 6 &= 2A \quad \text{या } A = 3 \\
 7 &= -9A + B \\
 &= -27 + B \\
 B &= 27 + 7 = 34 \quad [\because A = 3]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3 \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2 - 9x + 20}} dx + 34 \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9x + 20}} dx \\
 &= 3I_1 + 34I_2 \quad (\text{मान लीजिए}) \quad \dots(i)
 \end{aligned}$$

अब

$$I_1 = \int \frac{2x-9}{\sqrt{x^2 - 9x + 20}} dx$$

$$\because x^2 - 9x + 20 = t \text{ रखने पर,}$$

$$\therefore (2x-9) dx = dt$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = 2\sqrt{t} \\
 &= 2\sqrt{x^2 - 9x + 20} \quad \dots\dots(ii)
 \end{aligned}$$

तथा

$$\begin{aligned}
 I_2 &= \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - 9x + 20}} dx \\
 &= \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 9x + \frac{81}{4} + 20 - \frac{81}{4}}} \\
 &= \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} \\
 &= \frac{dx}{\sqrt{\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}}} \\
 &\quad \left[\because \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \log|x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right] \\
 &= \log \left| x - \frac{9}{2} + \sqrt{\left(x - \frac{9}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} \right| \\
 &= \log \left| x - \frac{9}{2} + \sqrt{x^2 - 9x + 20} \right| \quad \dots\dots(iii)
 \end{aligned}$$

समी. (ii) व (iii) का मान समी. (i) में रखने पर

$$\begin{aligned}
 \therefore 3I_1 + 34I_2 &= 3 \times 2\sqrt{x^2 - 9x + 20} + 34 \log \left| x - \frac{9}{2} + \sqrt{x^2 - 9x + 20} \right| + C \\
 &= 6\sqrt{x^2 - 9x + 20} + 34 \log \left| x - \frac{9}{2} + \sqrt{x^2 - 9x + 20} \right| + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 20. $\frac{x+2}{\sqrt{4x-x^2}} \cdot$

$$\begin{aligned}
 \text{हल : } \int \frac{x+2}{\sqrt{4x-x^2}} dx &= \int \frac{x+2}{\sqrt{-(x^2-4x+4)+4}} dx \\
 &= \int \frac{x+2}{\sqrt{4-(x-2)^2}} dx = \int \frac{x-2+4}{\sqrt{4-(x-2)^2}} dx \\
 &= \int \frac{x-2}{\sqrt{4-(x-2)^2}} dx + 4 \int \frac{1}{\sqrt{4-(x-2)^2}} dx
 \end{aligned}$$

$$\therefore 4 - (x-2)^2 = t \text{ रखने पर}$$

$$\therefore -2(x-2) dx = dt$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} + 4 \sin^{-1} \left(\frac{x-2}{2} \right) \quad \left[\because \int \frac{dt}{a^2-t^2} = \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + 4 \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \\
 &= -\sqrt{t} + 4 \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \\
 &= -\sqrt{4-(x-2)^2} + 4 \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C \\
 &= -\sqrt{4x-x^2} + 4 \sin^{-1}\left(\frac{x-2}{2}\right) + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 21. $\frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+3}}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x+2}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx &= \int \frac{\frac{1}{2}(2x+2)+1}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{\sqrt{x^2+2x+3}} dx + \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+3}}
 \end{aligned}$$

अब प्रथम समाकलन में $x^2+2x+3 = t$ रखने पर
 $\therefore (2x+2) dx = dt$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} + \int \frac{dx}{(x+1)^2+2} \\
 &= \frac{1}{2} \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + \log \left| (x+1) + \sqrt{(x+1)^2+2} \right| + C \\
 &= \sqrt{t} + \log \left| (x+1) + \sqrt{x^2+2x+3} \right| + C \\
 &= \sqrt{x^2+2x+3} + \log \left| (x+1) + \sqrt{x^2+2x+3} \right| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 22. $\frac{x+3}{x^2-2x-5}$.

हल :

$$\int \frac{x+3}{x^2-2x-5} dx$$

अब

$$\begin{aligned}
 x+3 &= A \frac{d}{dx}(x^2-2x-5) + B \\
 &= A(2x-2) + B
 \end{aligned}$$

 x तथा अचर संख्याओं की तुलना करने पर,

$$1 = 2A \text{ या } A = \frac{1}{2}$$

$$3 = -2A + B, B = 2A + 3 = 1 + 3 = 4$$

$$= \int \frac{\frac{1}{2}(2x-2)+4}{x^2-2x-5} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x-2}{x^2-2x-5} dx + 4 \int \frac{1}{x^2-2x-5} dx$$

पहले समाकलन में $x^2 - 2x - 5 = t$ रखने पर

$$\therefore (2x-2) dx = dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} + 4 \int \frac{1}{(x-1)^2 - 6} dx$$

$$= \frac{1}{2} \log |t| + 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{6}} \log \frac{(x-1)-\sqrt{6}}{x-1+\sqrt{6}} + C$$

$$\left[\because \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \log \left(\frac{x-a}{x+a} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \log |x^2 - 2x - 5| + \frac{2}{\sqrt{6}} \log \frac{x-1-\sqrt{6}}{x-1+\sqrt{6}} + C. \text{ उत्तर}$$

प्रश्न 23. $\frac{5x+3}{\sqrt{x^2+4x+10}}$.

हल :

Baniapur

$$5x+3 = A \frac{d}{dx}(x^2+4x+10) + B \\ = A(2x+4) + B$$

x तथा अचर संख्याओं के दोनों पक्षों की तुलना करने पर

$$5 = 2A \quad \text{या } A = \frac{5}{2}$$

$$3 = 4A + B \quad \text{या } B = 3 - 4A = 3 - 10 = -7$$

$$= \int \frac{\frac{5}{2}(2x+4)-7}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx$$

$$= \frac{5}{2} \int \frac{2x+4}{\sqrt{x^2+4x+10}} dx - 7 \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+4x+10}}$$

प्रथम समाकलन में $x^2 + 4x + 10 = t$ रखने पर तथा $(2x+4) dx = dt$

$$I = \frac{5}{2} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} - 7 \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)^2 + 6}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{5}{2} \cdot \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{\sqrt{t}} - 7 \log \left| (x+2) + \sqrt{(x+2)^2 + 6} \right| + C \\
 &= 5\sqrt{t} - 7 \log \left| (x+2) + \sqrt{x^2 + 4x + 10} \right| + C \\
 &= 5\sqrt{x^2 + 4x + 10} - 7 \log \left| (x+2) + \sqrt{x^2 + 4x + 10} \right| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 24 व 25 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 24. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$ बराबर है—

- (A) $x \tan^{-1}(x+1) + C$
 (B) $\tan^{-1}(x+1) + C$
 (C) $(x+1) \tan^{-1} x + C$
 (D) $\tan^{-1} x + C$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{x^2 + 2x + 2} &= \int \frac{dx}{(x+1)^2 + 1} \\
 &= \int \frac{dx}{(x+1)^2 + (1)^2} \\
 &= \tan^{-1}(x+1) + C
 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

प्रश्न 25. $\int \frac{dx}{\sqrt{9x - 4x^2}}$ बराबर है—

- (A) $\frac{1}{9} \sin^{-1} \left(\frac{9x-8}{8} \right) + C$
 (B) $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{8x-9}{9} \right) + C$
 (C) $\frac{1}{3} \sin^{-1} \left(\frac{9x-8}{8} \right) + C$
 (D) $\frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{9x-8}{8} \right) + C.$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{\sqrt{9x - 4x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{-(4x^2 - 9x)}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{-\left(4x^2 - 9x + \frac{81}{16}\right) + \frac{81}{16}}} \\
 &= \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{81}{16} - \left(2x - \frac{9}{4}\right)^2}}
 \end{aligned}$$

मान लीजिए

$$2x - \frac{9}{4} = t$$

तब

$$2dx = dt$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{\left(\frac{9}{4}\right)^2 - (t)^2} = \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{t}{9/4} + C$$

उत्तर

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{4t}{9} + C \\
 &= \frac{1}{2} \sin^{-1} \frac{4\left(2x - \frac{9}{4}\right)}{9} + C \\
 &= \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{8x - 9}{9} \right) + C
 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7.5

प्रश्न 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए—

प्रश्न 1. $\frac{x}{(x+1)(x+2)}$.

हल : मान लीजिए

$\therefore x = -1$ रखने पर,
 $x = -2$ रखने पर,

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{(x+1)(x+2)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \\
 x &= A(x+2) + B(x+1) \\
 -1 &= A \cdot 1 \text{ अर्थात् } A = -1 \\
 -2 &= B(-2+1) \text{ अर्थात् } B = 2 \\
 \frac{x}{(x+1)(x+2)} &= -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x+2} \\
 \int \frac{x}{(x+1)(x+2)} dx &\stackrel{\text{Since}}{=} \int \frac{1}{x+1} dx + 2 \int \frac{1}{x+2} dx \\
 &= -\log|x+1| + 2 \log|x+2| + C \\
 &= -\log|x+1| + \log(x+2)^2 \\
 &= \log \frac{(x+2)^2}{|x+1|} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\frac{1}{x^2 - 9}$.

हल :

$x = 3$ रखने पर,

$x = -3$ रखने पर,

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{x^2 - 9} &= \frac{1}{(x-3)(x+3)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3} \\
 1 &= A(x+3) + B(x-3)
 \end{aligned}$$

$$1 = A \cdot 6 \quad \text{या } A = \frac{1}{6}$$

$$1 = B(-6) \quad \text{या } B = -\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{x^2 - 9} = \frac{1}{6(x-3)} - \frac{1}{6(x+3)}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - 9} = \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x-3} - \frac{1}{6} \int \frac{dx}{x+3}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{6} \log|x - 3| - \frac{1}{6} \log|x + 3| + C \\
 &= \frac{1}{6} \log \left| \frac{x - 3}{x + 3} \right| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\frac{3x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}.$

हल :

$$\frac{3x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

$$3x - 1 = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2)$$

$$2 = A(-1)(-2) \text{ या } A = 1$$

$$5 = B.1(-1) \text{ या } B = -5$$

$$8 = C.2.1 \text{ या } C = 4$$

अब

$$\frac{3x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{1}{x - 1} - \frac{5}{x - 2} + \frac{4}{x - 3}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{3x - 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} dx &= \int \frac{1}{x - 1} dx - 5 \int \frac{1}{x - 2} dx + 4 \int \frac{1}{x - 3} dx \\
 &= \log|x - 1| - 5 \log|x - 2| + 4 \log|x - 3| + C. \text{ उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 4. $\frac{x}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}.$

हल : मान लीजिए

$$\frac{x}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x - 3}$$

$$x = A(x - 2)(x - 3) + B(x - 1)(x - 3) + C(x - 1)(x - 2)$$

$$1 = A(-1)(-2) \text{ या } A = \frac{1}{2}$$

$$2 = B.1(-1) \text{ या } B = -2$$

$$3 = C.2.1 \text{ या } 2C = 3 \text{ या } C = \frac{3}{2}$$

∴

$$\frac{x}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} = \frac{1}{2(x - 1)} - \frac{2}{(x - 2)} + \frac{3}{2(x - 3)}$$

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x - 1} dx - 2 \int \frac{1}{x - 2} dx + \frac{3}{2} \int \frac{1}{x - 3} dx \\
 &= \frac{1}{2} \log|x - 1| - 2 \log|x - 2| \\
 &\quad + \frac{3}{2} \log|x - 3| + C. \text{ उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 5. $\frac{2x}{x^2 + 3x + 2}.$

हल : मान लीजिए

$$\begin{aligned}
 \frac{2x}{x^2 + 3x + 2} &= \frac{2x}{(x + 1)(x + 2)} = \frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x + 2} \\
 2x &= A(x + 2) + B(x + 1)
 \end{aligned}$$

$x = -1$ लेने पर
 $x = -2$ लेने पर

$$\begin{aligned} -2 &= A(1) \quad \text{अर्थात् } A = -2 \\ -4 &= B(-1) \quad \text{अर्थात् } B = 4 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2x}{(x+1)(x+2)} = \frac{-2}{x+1} + \frac{4}{x+2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{(x+1)(x+2)} dx &= -2 \int \frac{1}{x+1} dx + 4 \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= -2 \log|x+1| + 4 \log|x+2| + C \\ &= 4 \log|x+2| - 2 \log|x+1| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 6. $\frac{1-x^2}{x(1-2x)}$.

हल :

$$\frac{1-x^2}{x(1-2x)} = \frac{1-x^2}{-2x^2+x}$$

अब अंश को हर से भाग देने पर,

अर्थात्

$$\frac{1-x^2}{x(1-2x)} = \frac{1}{2} + \frac{1-\frac{1}{2}x}{x-2x^2} = \frac{1}{2} + \frac{2-x}{2x(1-2x)} \quad \dots(i)$$

मान लीजिए

 \therefore $x = 0$ लेने पर, $x = \frac{1}{2}$ लेने पर,

या

या

अतः

समीकरण (i) से,

$$\begin{aligned} \frac{2-x}{x(1-2x)} &= \left[\frac{A}{x} + \frac{B}{1-2x} \right] \\ 2-x &= A(1-2x) + Bx \\ 2 &= A \quad \text{अर्थात् } A = 2 \end{aligned}$$

$$2 - \frac{1}{2} = 0 + B \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{B}{2} = \frac{3}{2}$$

$$B = 3$$

$$\frac{2-x}{x(1-2x)} = \frac{2}{x} + \frac{3}{1-2x}$$

$$\frac{1-x^2}{x(1-2x)} = \frac{1}{2} + \frac{2-x}{2x(1-2x)}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left[\frac{2}{x} + \frac{3}{1-2x} \right]$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{x} + \frac{3}{2(1-2x)}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{1-x^2}{x(1-2x)} dx &= \frac{1}{2} \int dx + \int \frac{1}{x} dx + \frac{3}{2} \int \frac{1}{1-2x} dx \\ &= \frac{1}{2} x + \log|x| + \frac{3}{2} \left(\frac{1}{-2} \right) \log|1-2x| + C \\ &= \frac{1}{2} x + \log|x| - \frac{3}{4} \log|1-2x| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 7. $\frac{x}{(x^2 + 1)(x - 1)}$.

हल : मान लीजिए $\frac{x}{(x^2 + 1)(x - 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 1}$
 $\therefore x = A(x^2 + 1) + (Bx + C)(x - 1)$
 $x = A(x^2 + 1) + B(x^2 - x) + C(x - 1)$

$x = 1$ रखने पर, $1 = A \times 2$ या $A = \frac{1}{2}$

x^2 तथा x के गुणांक की तुलना करने पर,

$$0 = A + B \text{ या } B = -A = -\frac{1}{2}$$

तथा $1 = -B + C$ या $C = 1 + B = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

अतः

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x^2 + 1)(x - 1)} &= \frac{1}{2(x - 1)} + \frac{-\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}}{x^2 + 1} \\ &= \frac{1}{2(x - 1)} - \frac{\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}}{x^2 + 1} \\ &= \frac{1}{2(x - 1)} - \frac{x}{2(x^2 + 1)} + \frac{1}{2(x^2 + 1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{(x^2 + 1)(x - 1)} &= \frac{1}{2} \int \frac{1}{x - 1} \, dx - \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2 + 1} \, dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2 + 1} \, dx \\ &= \frac{1}{2} \log|x - 1| - \frac{1}{4} \log|x^2 + 1| + \frac{1}{2} \tan^{-1}x + C. \quad \text{उत्तर} \end{aligned}$$

प्रश्न 8. $\frac{x}{(x - 1)^2(x + 2)}$.

हल : मान लीजिए

Baniapur

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x - 1)^2(x + 2)} &= \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{(x - 1)^2} + \frac{C}{x + 2} \\ \therefore x &= A(x - 1)(x + 2) + B(x + 2) + C(x - 1)^2 \end{aligned}$$

$x = 1$ रखने पर, $1 = B \times 3$ या $B = \frac{1}{3}$

$x = -2$ रखने पर, $-2 = C(-3)^2$ या $C = -\frac{2}{9}$

x^2 के गुणांक की तुलना करने पर,

$$0 = A + C \text{ या } A = -C = \frac{2}{9}$$

$$\therefore \frac{x}{(x - 1)^2(x + 2)} = \frac{2}{9(x - 1)} + \frac{1}{3(x - 1)^2} - \frac{2}{9(x + 2)}$$

या

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x}{(x-1)^2(x+2)} dx &= \frac{2}{9} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{3} \int \frac{1}{(x-1)^2} dx - \frac{2}{9} \int \frac{1}{x+2} dx \\
 &= \frac{2}{9} \log|x-1| + \frac{1}{3} \frac{(x-1)^{-2+1}}{-2+1} - \frac{2}{9} \log|x+2| + C \\
 &= \frac{2}{9} \log|x-1| - \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{9} \log|x+2| + C \\
 &= \frac{2}{9} \log \left| \frac{x-1}{x+2} \right| - \frac{1}{3(x-1)} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 9. $\frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1}$.

हल : ∵ $\frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} = \frac{3x+5}{x^2(x-1)-(x-1)} = \frac{3x+5}{(x-1)(x^2-1)}$

$$= \frac{3x+5}{(x-1)(x-1)(x+1)}$$

$$\therefore \frac{3x+5}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

$$\therefore 3x+5 = A(x-1)^2 + B(x+1)(x-1) + C(x+1)$$

 $x = 1$ लेने पर, $x = -1$ लेने पर,

$$8 = C \times 2 \text{ या } C = 4$$

अब x^2 के गुणांक की तुलना करने पर

$$0 = A + B \text{ या } B = -A = -\frac{1}{2}$$

अतः

$$\frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} = \frac{1}{2(x+1)} - \frac{1}{2(x-1)} + \frac{4}{(x-1)^2}$$

या $\int \frac{3x+5}{x^3-x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx + 4 \int \frac{1}{(x-1)^2} dx$

$$= \frac{1}{2} \log|x+1| - \frac{1}{2} \log|x-1| + 4 \frac{(x-1)^{-2+1}}{-2+1} + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x+1}{x-1} \right| - \frac{4}{x-1} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 10. $\frac{2x-3}{(x^2-1)(2x+3)}$.

हल :

$$\frac{2x-3}{(x^2-1)(2x+3)} = \frac{2x-3}{(x-1)(x+1)(2x+3)}$$

मान लीजिए

$$\frac{2x-3}{(x^2-1)(2x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{2x+3}$$

∴

$$2x - 3 = A(x + 1)(2x + 3) + B(x - 1)(2x + 3) + C(x^2 - 1)$$

 $x = 1$ लेने पर,

$$-1 = A \times 2 \times 5 \text{ या } A = -\frac{1}{10}$$

 $x = -1$ लेने पर,

$$-5 = B(-2)(1) \text{ या } B = \frac{5}{2}$$

 $x = -\frac{3}{2}$ लेने पर,

$$-6 = C\left(\frac{9}{4} - 1\right) = C\left(\frac{5}{4}\right)$$

∴

$$C = \frac{-6 \times 4}{5} = -\frac{24}{5}$$

अतः

$$\frac{2x - 3}{(x^2 - 1)(2x + 3)} = -\frac{1}{10(x - 1)} + \frac{5}{2(x + 1)} - \frac{24}{5} \cdot \frac{1}{2x + 3}$$

या $\int \frac{2x - 3}{(x^2 - 1)(2x + 3)} dx = -\frac{1}{10} \int \frac{1}{x - 1} dx + \frac{5}{2} \int \frac{1}{x + 1} dx - \frac{24}{5} \int \frac{1}{2x + 3} dx$

$$= -\frac{1}{10} \log|x - 1| + \frac{5}{2} \log|x + 1| - \frac{24}{5} \cdot \frac{1}{2} \log|2x + 3| + C$$

$$= \frac{5}{2} \log|x + 1| - \frac{1}{10} \log|x - 1| - \frac{12}{5} \log|2x + 3| + C.$$
उत्तर

प्रश्न 11. $\frac{5x}{(x+1)(x^2-4)}.$

हल : मान लीजिए

$$\frac{5x}{(x+1)(x^2-4)} = \frac{5x}{(x+1)(x-2)(x+2)}$$

$$= \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{x+2}$$

$$5x = A(x-2)(x+2) + B(x+1)(x+2) + C(x+1)(x-2)$$

 $x = -1$ रखने पर,

$$-5 = A(1)(-3) \text{ या } A = \frac{5}{3}$$

 $x = -2$ रखने पर,

$$-10 = C(-1)(-2-2) \text{ या } C = -\frac{10}{4} = -\frac{5}{2}$$

 $x = 2$ रखने पर,

$$10 = B(3)(4) \text{ या } 12B = 10 \text{ या } B = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$$

∴

$$\frac{5x}{(x+1)(x^2-4)} = \frac{5}{3(x+1)} + \frac{5}{6(x-2)} - \frac{5}{2(x+2)}$$

या

$$\begin{aligned} \int \frac{5x}{(x+1)(x^2-4)} dx &= \frac{5}{3} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{5}{6} \int \frac{1}{x-2} dx - \frac{5}{2} \int \frac{1}{x+2} dx \\ &= \frac{5}{3} \log|x+1| + \frac{5}{6} \log|x-2| - \frac{5}{2} \log|x+2| + C. \text{ उत्तर} \end{aligned}$$

प्रश्न 12. $\frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1}.$

हल : ∵ $\frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1}$ में अंश की घात हर की घात से अधिक है इसलिए

$x^3 + x + 1$ को $x^2 - 1$ से भाग देने पर

$$\therefore \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{2x + 1}{x^2 - 1} = x + \frac{2x}{x^2 - 1} + \frac{1}{x^2 - 1}$$

$$\begin{aligned} \text{या } \int \frac{x^3 + x + 1}{x^2 - 1} dx &= \int x dx + \int \frac{2x}{x^2 - 1} dx + \int \frac{1}{x^2 - 1} dx \\ &= \frac{x^2}{2} + \log|x^2 - 1| + \frac{1}{2} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| + C \\ &= \frac{x^2}{2} + \log|(x-1)(x+1)| + \frac{1}{2} \log|x-1| - \frac{1}{2} \log|x+1| + C \\ &= \frac{x^2}{2} + \log|x-1| + \log|x+1| \\ &\quad + \frac{1}{2} \log|x-1| - \frac{1}{2} \log|x+1| + C \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} \log|x-1| + \frac{1}{2} \log|x+1| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\frac{2}{(1-x)(1+x^2)}$.

हल : मान लीजिए

$$\frac{2}{(1-x)(1+x^2)} = \frac{A}{1-x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}$$

$$\begin{aligned} 2 &= A(1+x^2) + (Bx+C)(1-x) \\ &= A(1+x^2) + B(x-x^2) + C(1-x) \end{aligned}$$

$x = 1$ लेने पर,

$$2 = A(2) \text{ या } 2A = 2 \text{ या } A = 1$$

x^2 तथा x के गुणांकों की तुलना करने पर

$$0 = A - B \text{ या } B = A = 1$$

$$0 = B - C \text{ या } C = B = 1$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{2}{(1-x)(1+x^2)} &= \frac{1}{1-x} + \frac{x+1}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{1-x} + \frac{x}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

$$\int \frac{2}{(1-x)(1+x^2)} dx = \int \frac{1}{1-x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= -\int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2+1} dx + \int \frac{2x}{x^2+1}$$

$$= -\log|x-1| + \frac{1}{2} \log(1+x^2) + \tan^{-1}x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 14. $\frac{3x-1}{(x-2)^2}.$

हल : मान लीजिए

$$\frac{3x-1}{(x-2)^2} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2}$$

$$3x-1 = A(x-2) + B$$

$$6-1 = B \text{ या } B = 5$$

$x = 2$ लेने पर,

दोनों पक्षों के x के गुणांकों की तुलना करने पर

$$3 = A \text{ या } A = 3$$

$$\therefore \frac{3x-1}{(x-2)^2} = \frac{3}{x-2} + \frac{5}{(x-2)^2}$$

या

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-1}{(x-2)^2} dx &= 3 \int \frac{dx}{x-2} + 5 \int \frac{dx}{(x-2)^2} \\ &= 3 \log|x-2| - \frac{5}{x-2} + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 15. $\frac{1}{x^4-1}.$

हल : मान लीजिए

$$\frac{1}{x^4-1} = \frac{1}{(x-1)(x+1)(x^2+1)}$$

$$= \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$$

$$1 = A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (Cx+D)(x^2-1)$$

$$\begin{aligned} 1 &= A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) \\ &\quad + C(x^3-x) + D(x^2-1) \end{aligned}$$

$$1 = A \times 2 \times 2 \text{ या } A = \frac{1}{4}$$

$$1 = B(-2)(2) \text{ या } -4B = 1 \text{ या } B = -\frac{1}{4}$$

x^3 तथा x^2 के गुणांकों की तुलना करने पर,

$$0 = A + B + C \text{ या } C = -A - B = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$$

$$0 = A - B + D \text{ या } D = B - A = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{x^4-1} = \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{2(x^2+1)}$$

या

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^4-1} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{4} \int \frac{1}{x+1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{4} \log|x-1| - \frac{1}{4} \log|x+1| - \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C \\ &= \frac{1}{4} \log \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 16. $\frac{1}{x(x^n + 1)}.$

हल : मान लीजिए $\int \frac{1}{x(x^n + 1)} dx = \int \frac{x^{n-1}}{x^{n-1} \cdot x(x^n + 1)} dx = \int \frac{x^{n-1} dx}{x^n(x^n + 1)}$

यहाँ $x^n = t$ रखने पर $n x^{n-1} dx = dt$

$$= \frac{1}{n} \int \frac{dt}{t(t+1)}$$

अब

$$\frac{1}{t(t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1}$$

$$1 = A(t+1) + Bt$$

$$1 = A \text{ या } A = 1$$

$$1 = B(-1) \text{ या } B = -1$$

∴

$$\frac{1}{t(t+1)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}$$

$$\frac{1}{n} \int \frac{dt}{t(t+1)} = \frac{1}{n} \int \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right) dt$$

$$= \frac{1}{n} [\log |t| - \log |t+1|] + C$$

$$= \frac{1}{n} \log \left| \frac{t}{t+1} \right| + C$$

$$= \frac{1}{n} \log \left| \frac{x^n}{x^n + 1} \right| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 17. $\frac{\cos x}{(1 - \sin x)(2 - \sin x)}.$

हल : $\int \frac{\cos x}{(1 - \sin x)(2 - \sin x)} dx$

∴ $\sin x = t$ रखने पर

∴ $\cos x dx = dt$

$$= \int \frac{dt}{(1-t)(2-t)}$$

अब

$$\frac{1}{(1-t)(2-t)} = \frac{A}{1-t} + \frac{B}{2-t} \quad \dots(i)$$

$$1 = A(2-t) + B(1-t)$$

$$1 = A \times 1 \text{ या } A = 1$$

$$1 = B(1-2) \text{ या } -B = 1 \text{ या } B = -1$$

A तथा B के मान समीकरण (i) में रखने पर

$$\therefore \frac{1}{(1-t)(2-t)} = \frac{1}{1-t} - \frac{1}{2-t}$$

Baniapur

$$\begin{aligned}
 & \int \frac{dt}{(1-t)(2-t)} \\
 &= \int \frac{1}{1-t} dt - \int \frac{1}{2-t} dt \\
 &= -\log|1-t| + \log|2-t| + C \\
 &= \log \left| \frac{2-t}{1-t} \right| + C \\
 &= \log \left| \frac{2-\sin x}{1-\sin x} \right| + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 18. $\frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)}$.

हल : $\frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)}$ में $x^2 = t$ रखने पर

$$\frac{(x^2+1)(x^2+2)}{(x^2+3)(x^2+4)} = \frac{(t+1)(t+2)}{(t+3)(t+4)} = \frac{t^2+3t+2}{t^2+7t+12}$$

इस परिमेय में अंश व हर की घात बराबर है इसलिए अंश को हर से भाग देने पर

$$\begin{aligned}
 \therefore \frac{t^2+3t+2}{t^2+7t+12} &= 1 - \frac{4t+10}{t^2+7t+12} \\
 &= 1 - \frac{2(2t+5)}{t^2+7t+12} \quad \dots(i)
 \end{aligned}$$

अब लीजिए

$$\begin{aligned}
 \therefore t = -3 \text{ लेने पर,} \\
 t = -4 \text{ लेने पर,}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{2t+5}{t^2+7t+12} &= \frac{2t+5}{(t+3)(t+4)} = \frac{A}{t+3} + \frac{B}{t+4} \\
 2t+5 &= A(t+4) + B(t+3) \\
 -1 &= A \times 1 \text{ या } A = -1 \\
 -3 &= B(-4+3) \text{ या } B = 3
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{2t+5}{t^2+7t+12} = -\frac{1}{t+3} + \frac{3}{t+4}$$

समीकरण (i) में $t = x^2$ रखने पर,

$$\begin{aligned}
 & \int \left\{ 1 - 2 \left(-\frac{1}{x^2+3} + \frac{3}{x^2+4} \right) \right\} dx \\
 &= \int dx + 2 \int \frac{1}{x^2+3} dx - 6 \int \frac{1}{x^2+4} dx \\
 &= \int dx + 2 \int \frac{1}{x^2+(\sqrt{3})^2} dx - 6 \int \frac{1}{x^2+(2)^2} dx \\
 &\quad \left[\because \int \frac{1}{x^2+a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a} \right]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= x + 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{6}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} + C \\
 &= x + \frac{2}{\sqrt{3}} \tan^{-1} \frac{x}{\sqrt{3}} - 3 \tan^{-1} \frac{x}{2} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 19. $\frac{2x}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)}$.

हल : $\int \frac{2x}{(x^2 + 1)(x^2 + 3)} dx$, मान लीजिए $x^2 = t$, $\therefore 2x dt = dt$

$$= \int \frac{dt}{(t+1)(t+3)}$$

अब

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(t+1)(t+3)} &= \frac{A}{t+1} + \frac{B}{t+3} \\
 1 &= A(t+3) + B(t+1) \\
 1 &= A \times 2 \text{ या } A = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

 $t = -1$ लेने पर, $t = -3$ लेने पर,

$$1 = B(-3+1) \text{ या } -2B = 1 \text{ या } B = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{(t+1)(t+3)} = \frac{1}{2(t+1)} - \frac{1}{2(t+3)}$$

$$\therefore \int \frac{1}{(t+1)(t+3)} dt = \frac{1}{2} \int \frac{1}{t+1} dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t+3} dt$$

$$= \frac{1}{2} \log |t+1| - \frac{1}{2} \log |t+3| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{t+1}{t+3} \right| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x^2+1}{x^2+3} \right| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 20. $\frac{1}{x(x^4 - 1)}$.

हल : $\int \frac{1}{x(x^4 - 1)} dx = \int \frac{x^3}{x^4(x^4 - 1)} dx$

 $\therefore x^4 = t$ रखने पर

$$\therefore 4x^3 dx = dt$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t(t-1)} \quad \dots(i)$$

अब लीजिए

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{(t-1)t} &= \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t} \\
 1 &= At + B(t-1)
 \end{aligned}$$

$t = 0$ लेने पर,

$t = 1$ लेने पर,

$$\therefore \frac{1}{(t-1)t} = \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}$$

अब समीकरण (i) से,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} \right) dt \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{t-1} dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{t} dt \\ &= \frac{1}{4} \log |t-1| - \frac{1}{4} \log |t| + C \\ &= \frac{1}{4} \log \left| \frac{t-1}{t} \right| + C \\ &= \frac{1}{4} \log \left| \frac{x^4 - 1}{x^4} \right| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 21. $\frac{1}{(e^x - 1)}$.

हल :

$$\int \frac{dx}{(e^x - 1)} = \int \frac{e^x dx}{e^x(e^x - 1)}$$

मान लीजिए $e^x = t$ हो, तब $e^x dx = dt$

$$= \int \frac{dt}{t(t-1)}$$

अब लीजिए

$$\frac{1}{t(t-1)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{t}$$

$t = 1$ लेने पर,

$t = 0$ लेने पर,

\therefore

या

$$\begin{aligned} 1 &= At + B(t-1) \\ 1 &= A \times 1 \text{ या } A = 1 \\ 1 &= B(-1) \text{ या } B = -1 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{t(t-1)} = \frac{1}{t-1} - \frac{1}{t}$$

$$\begin{aligned} &\int \frac{1}{t(t-1)} dt \\ &= \int \frac{1}{t-1} dt - \int \frac{1}{t} dt \\ &= \log |t-1| - \log |t| + C \\ &= \log \frac{|t-1|}{|t|} + C \\ &= \log \left| \frac{e^x - 1}{e^x} \right| + C. \end{aligned}$$

($t = e^x$ रखने पर) उत्तर

प्रश्न 22 व 23 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 22. $\int \frac{x \, dx}{(x-1)(x-2)}$ बराबर है—

- | | |
|--|---|
| (A) $\log \left \frac{(x-1)^2}{x-2} \right + C$ | (B) $\log \left \frac{(x-2)^2}{x-1} \right + C$ |
| (C) $\log \left \left(\frac{x-1}{x-2} \right)^2 \right + C$ | (D) $\log (x-1)(x-2) + C$ |

हल :

$$\frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$$

$$x = A(x-2) + B(x-1)$$

$$1 = A(1-2)$$

$$-A = 1 \text{ या } A = -1$$

$$2 = B(2-1)$$

$$B = 2$$

अब

$$\frac{x}{(x-1)(x-2)} = -\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2}$$

$$\begin{aligned} \therefore \int \frac{x \, dx}{(x-1)(x-2)} &= -\int \frac{1}{x-1} \, dx + 2 \int \frac{1}{x-2} \, dx \\ &= B \log |x-1| + 2 \log |x-2| + C \\ &= \log \left| \frac{(x-2)^2}{x-1} \right| + C. \end{aligned}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

54

उत्तर

प्रश्न 23. $\int \frac{dx}{x(x^2+1)}$ बराबर है—

- | |
|---|
| (A) $\log x - \frac{1}{2} \log (x^2 + 1) + C$ |
| (B) $\log x + \frac{1}{2} \log (x^2 + 1) + C$ |
| (C) $-\log x + \frac{1}{2} \log (x^2 + 1) + C$ |
| (D) $\frac{1}{2} \log x + \log (x^2 + 1) + C$. |

हल :

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)} = \int \frac{x \, dx}{x^2(x^2+1)}$$

मान लीजिए $x^2 = t$ हो, तब $2x \, dx = dt$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t(t+1)}$$

प्रश्न 22 व 23 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 22. $\int \frac{x \, dx}{(x-1)(x-2)}$ बराबर है—

(A) $\log \left| \frac{(x-1)^2}{x-2} \right| + C$

(B) $\log \left| \frac{(x-2)^2}{x-1} \right| + C$

(C) $\log \left| \left(\frac{x-1}{x-2} \right)^2 \right| + C$

(D) $\log |(x-1)(x-2)| + C$

हल :

$$\frac{x}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2}$$

या

$$x = A(x-2) + B(x-1)$$

$x = 1$ लेने पर,

$$1 = A(1-2)$$

या

$$-A = 1 \text{ या } A = -1$$

$x = 2$ लेने पर,

$$2 = B(2-1)$$

या

$$B = 2$$

अब

$$\frac{x}{(x-1)(x-2)} = -\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2}$$

∴

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{(x-1)(x-2)} &= -\int \frac{1}{x-1} \, dx + 2 \int \frac{1}{x-2} \, dx \\ &= -\log|x-1| + 2 \log|x-2| + C \\ &= \log \left| \frac{(x-2)^2}{x-1} \right| + C. \end{aligned}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्न 23. $\int \frac{dx}{x(x^2+1)}$ बराबर है— Baniapur

(A) $\log|x| - \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(B) $\log|x| + \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(C) $-\log|x| + \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C$

(D) $\frac{1}{2} \log|x| + \log(x^2+1) + C.$

हल :

$$\int \frac{dx}{x(x^2+1)} = \int \frac{x \, dx}{x^2(x^2+1)}$$

मान लीजिए $x^2 = t$ हो, तब $2x \, dx = dt$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t(t+1)}$$

अब

$$\frac{1}{t(t+1)} = \frac{A}{t} + \frac{B}{t+1}$$

$$1 = A(t+1) + Bt$$

 $t = 0$ लेने पर,

$$1 = A \text{ या } A = 1$$

 $t = -1$ लेने पर,

$$1 = B \times (-1) \text{ या } B = -1$$

∴

$$\frac{1}{t(t+1)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1}$$

अतः

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t(t+1)} &= \frac{1}{2} \left[\int \frac{1}{t} dt - \int \frac{1}{t+1} dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \log |t| - \frac{1}{2} \log |t+1| + C \\ &= \frac{1}{2} \log |x^2| - \frac{1}{2} \log |x^2+1| + C \\ &= \log |x| - \frac{1}{2} \log |x^2+1| + C. \end{aligned}$$

(t = x² रखने पर)

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7·6

प्रश्न 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए—

प्रश्न 1. $x \sin x$.हल : $\int x \sin x dx$

Baniapur

$$\int uv dx = u \int v dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v dx \right) dx$$

 $u = x$ तथा $v = \sin x$ लेने पर,

$$\begin{aligned} &= x \int \sin x dx - \int \left[\left(\frac{d}{dx} x \right) \int \sin x dx \right] dx \\ &= x(-\cos x) - \int 1(-\cos x) dx \\ &= -\cos x + \sin x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 2. $x \sin 3x$.हल : $\int x \sin 3x dx$

खण्डशः समाकलन से,

$$\int uv dx = u \int v dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v dx \right) dx$$

 $u = x$ तथा $v = 3x$ लेने पर

$$\begin{aligned}
 \int x \sin 3x \, dx &= x \left(-\frac{\cos 3x}{3} \right) - \int 1 \cdot \left(-\frac{\cos 3x}{3} \right) dx \\
 &= -\frac{x \cos 3x}{3} + \frac{1}{3} \int \cos 3x \, dx \\
 &= -\frac{x \cos 3x}{3} + \frac{1}{9} \sin 3x + C \\
 &= -\frac{x}{3} \cos 3x + \frac{1}{9} \sin 3x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 3. $x^2 e^x$.हल : $\int x^2 e^x \, dx$

खण्डशः समाकलन से,

 $u = x^2$ तथा $v = e^x$ लेने पर

$$\begin{aligned}
 \int uv \, dx &= u \int v \, dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v \, dx \right) dx \\
 &= x^2 \int e^x \, dx - \int \left(\frac{d}{dx} x^2 \int e^x \, dx \right) dx \\
 &= x^2 e^x - \int 2x e^x \, dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x \, dx
 \end{aligned}$$

पुनः खण्डशः समाकलन करने पर

$$\begin{aligned}
 &= x^2 e^x - 2 \left[x \int e^x \, dx - \int \left(1 \cdot \int e^x \, dx \right) dx \right] \\
 &= x^2 e^x - 2 \left[x e^x - \int e^x \, dx \right] \\
 &= x^2 e^x - 2x e^x + 2 e^x + C \\
 &= e^x (x^2 - 2x + 2) + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 4. $x \log x$.हल : $\int x \log x \, dx$

खण्डशः समाकलन से,

$$\int uv \, dx = u \int v \, dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v \, dx \right) dx$$

 $u = \log x$ तथा $v = x$ रखने पर,

$$\begin{aligned}
 \int x \log x \, dx &= (\log x) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \, dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \int x \, dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + C \\
 &= \frac{x^2}{2} \log x - \frac{1}{4} x^2 + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 5. $x \log 2x$.

हल : $\int x \log 2x dx$

खण्डशः समाकलन से,

$$\int uv dx = u \int v dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v dx \right) dx$$

यहाँ $u = \log 2x$ तथा $v = x$ लेने पर,

$$\begin{aligned} &= \log 2x \int x dx - \int \left[\frac{d}{dx} (\log 2x) \int x dx \right] dx \\ &= (\log 2x) \times \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \log 2x - \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{x^2}{2} \log 2x - \frac{x^2}{4} + C. \end{aligned}$$

प्रश्न 6. $x^2 \log x$.

हल : $\int x^2 \log x dx = \int (\log x) x^2 dx$

खण्डशः समाकलन से,

$$\int uv dx = u \int v dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v dx \right) dx$$

यहाँ $u = \log x$ तथा $v = x^2$ लेने पर

$$\begin{aligned} &= (\log x) \int x^2 dx - \int \left[\frac{d}{dx} (\log x) \int x^2 dx \right] dx \\ &= (\log x) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^3}{3} dx \\ &= \frac{x^3}{3} \log x - \frac{1}{3} \int x^2 dx \\ &= \frac{x^3}{3} \log x - \frac{x^3}{9} + C. \end{aligned}$$

प्रश्न 7. $x \sin^{-1} x$.

हल : $\int x \sin^{-1} x dx = \int (\sin^{-1} x) x dx$

खण्डशः समाकलन से,

$$\int uv dx = u \int v dx - \int \left(\frac{du}{dx} \int v dx \right) dx$$

यहाँ $u = \sin^{-1} x$ तथा $v = x$ लेने पर

$$= (\sin^{-1} x) \int x dx - \int \left[\frac{d}{dx} (\sin^{-1} x) \int x dx \right] dx$$

उत्तर

उत्तर

$$\begin{aligned}
 &= (\sin^{-1} x) \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{x^2}{2} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \int \frac{1-x^2-1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \int \left(\sqrt{1-x^2} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x + \frac{1}{2} \left[\frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \sin^{-1} x \right] - \frac{1}{2} \sin^{-1} x + C \\
 &\quad \left[\because \int \sqrt{a^2-x^2} = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2} \right] \\
 &= \frac{x^2}{2} \sin^{-1} x + \frac{x}{4} \sqrt{1-x^2} - \frac{1}{4} \sin^{-1} x + C \\
 &= \frac{1}{4} (2x^2-1) \sin^{-1} x + \frac{x \sqrt{1-x^2}}{4} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 8. $x \tan^{-1} x$.

हल : $\int x \tan^{-1} x \, dx = \int (\tan^{-1} x) \cdot x \, dx$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned}
 &(\tan^{-1} x) \int x \, dx - \int \left(\frac{d}{dx} \tan^{-1} x \int x \, dx \right) dx \\
 &= (\tan^{-1} x) \frac{x^2}{2} - \int \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{x^2}{2} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{x^2+1} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x^2} dx \\
 &= \frac{x^2}{2} \tan^{-1} x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \tan^{-1} x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 9. $x \cos^{-1} x$.

हल : $\int x \cos^{-1} x \, dx = \int (\cos^{-1} x) \cdot x \, dx$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned}
 &= (\cos^{-1} x) \int x dx - \int \left[\frac{d}{dx} (\cos^{-1} x) \int x dx \right] dx \\
 &= \cos^{-1} x \cdot \frac{x^2}{2} - \int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{x^2}{2} dx + C
 \end{aligned}$$

मान लीजिए $x = \cos \theta$
तब $dx = -\sin \theta d\theta$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x + \frac{1}{2} \int \frac{\cos^2 \theta}{\sqrt{1-\cos^2 \theta}} [-\sin \theta] d\theta \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{\cos^2 \theta}{\sin \theta} \times \sin \theta d\theta \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{1}{4} \int (1 + \cos 2\theta) d\theta \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{1}{4} \int 1 d\theta - \frac{1}{4} \int \cos 2\theta d\theta \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{\theta}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\sin 2\theta}{2} + C \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{\theta}{4} - \frac{1}{8} \cdot 2 \sin \theta \cos \theta + C \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{\cos^{-1} x}{4} - \frac{\sqrt{1-x^2}}{4} \cdot x + C \\
 &= \frac{x^2}{2} \cos^{-1} x - \frac{1}{4} \cos^{-1} x - \frac{x\sqrt{1-x^2}}{4} + C \\
 &= \frac{(2x^2-1)}{4} \cos^{-1} x - \frac{x\sqrt{1-x^2}}{4} + C
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 10 $(\sin^{-1} x)^2$.हल : $\int (\sin^{-1} x)^2 dx$ मान लीजिए $\sin^{-1} x = \theta$ हो, तब $x = \sin \theta$, $dx = \cos \theta d\theta$

$$= \int \theta^2 \cos \theta d\theta$$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$= \theta^2 \sin \theta - \int 2\theta \sin \theta d\theta$$

पुनः खण्डशः समाकलन करने पर

$$\begin{aligned}
 &= \theta^2 \sin \theta - 2[\theta(-\cos \theta) - \int 1(-\cos \theta) d\theta] \\
 &= \theta^2 \sin \theta + 2\theta \cos \theta - 2 \int \cos \theta d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \theta^2 \sin \theta + 2\theta \cos \theta - 2 \sin \theta + C \\ &= \theta^2 \sin \theta + 2\theta \sqrt{1 - \sin^2 \theta} - 2 \sin \theta + C \end{aligned}$$

$\sin \theta = x$ या $\theta = \sin^{-1} x$ रखने पर

$$\begin{aligned} &= x (\sin^{-1} x)^2 + 2\sqrt{1 - x^2} (\sin^{-1} x) - 2x + C \\ &= (\sin^{-1} x)^2 x + 2\sqrt{1 - x^2} \sin^{-1} x - 2x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 11. $\frac{x \cos^{-1} x}{\sqrt{1 - x^2}}.$

हल :

$$\frac{x \cos^{-1} x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

मान लीजिए $\cos^{-1} x = t$ हो, तब, $x = \cos t, -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} dx = dt$

∴

$$\begin{aligned} \int \frac{x \cos^{-1} x}{\sqrt{1 - x^2}} dx &= - \int \cot t \cdot t \cdot dt \\ &= - [t(\sin t) - \int 1 \cdot \sin t \cdot dt] \\ &= - t \sin t + (-\cos t) + C \\ &= - \sqrt{1 - \cos^2 t} \cdot t - \cos t + C \\ &= - \sqrt{1 - x^2} \cos^{-1} x - x + C \\ &= - [\sqrt{1 + x^2} \cos^{-1} x + x] + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 12. $x \sec^2 x.$

हल : $\int x \sec^2 x dx$

खण्डश: समाकलन करने पर,

Baniapur

$$\begin{aligned} &= x \tan x - \int 1 \cdot \tan x \cdot dx \\ &= x \tan x + \log |\cos x| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\tan^{-1} x.$

हल : $\int \tan^{-1} x \ dx = \int (\tan^{-1} x) \cdot 1 \ dx$

खण्डश: समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} &= (\tan^{-1} x) \cdot x - \int \frac{1}{1 + x^2} \cdot x \ dx \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{2x}{1 + x^2} dx, && 1 + x^2 = t \text{ रखने पर} \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} && \Rightarrow 2dx = dt \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log |t| + C \\ &= x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log |1 + x^2| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 14. $x(\log x)^2$.

हल : $\int x(\log x)^2 dx = \int (\log x)^2 \cdot x dx$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} &= (\log x)^2 \cdot \frac{x^2}{2} - \int 2(\log x) \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} (\log x)^2 - \int (\log x) \cdot x dx \end{aligned}$$

पुनः खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2}{2} (\log x)^2 - \log(x) \frac{x^2}{2} + \int \frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} (\log x)^2 - \frac{x^2}{2} \log x + \frac{1}{2} \int x dx \\ &= \frac{x^2}{2} (\log x)^2 - \frac{x^2}{2} \log x + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + C \\ &= \frac{x^2}{2} (\log x)^2 - \frac{x^2}{2} (\log x) + \frac{x^2}{4} + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 15. $(x^2 + 1) \log x$.

हल : $\int (x^2 + 1) \log x dx = \int (\log x)(x^2 + 1) dx$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} &= (\log x) \cdot \left(\frac{x^3}{3} + x \right) - \int \frac{1}{x} \left(\frac{x^3}{3} + x \right) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \log x - \int \left(\frac{x^2}{3} + 1 \right) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \log x - \frac{1}{3} \int x^2 dx - \int 1 dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \log x - \frac{x^3}{9} - x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 16. $e^x (\sin x + \cos x)$.

हल : $\int e^x (\sin x + \cos x) dx$

$$\begin{aligned} &= \int_{\text{II}} e^x \sin x dx + \int_{\text{I}} e^x \cos x dx \\ &= \sin x \cdot e^x - \int \cos x \cdot e^x dx + \int e^x \cos x dx \\ &= \sin x \cdot e^x + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 17. $\frac{xe^x}{(1+x)^2} \cdot$

हल :

$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = \int \frac{e^x(x+1-1)}{(1+x)^2} dx$$

$$= \int e^x \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{(x+1)^2} \right) dx$$

$$\text{यदि } [f(x)] = \frac{1}{x+1} \text{ तो } \int e^x f(x) + f'(x) dx \text{ यदि } f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$= \int \frac{1}{x+1} \cdot e^x dx - \int \frac{1}{(x+1)^2} e^x dx$$

$$= \frac{1}{x+1} e^x - \int -\frac{1}{(x+1)^2} e^x dx - \int \frac{1}{(x+1)^2} e^x dx$$

$$= \frac{e^x}{x+1} + \int \frac{e^x}{(x+1)^2} dx - \int \frac{e^x}{(x+1)^2} dx$$

$$= \frac{e^x}{x+1} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 18. $e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x} \right).$

हल :

$$\int e^x \left(\frac{1+\sin x}{1+\cos x} \right) dx = \int \frac{e^x \left(1 + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} \right)}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx$$

$$= \int e^x \left(\frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + \tan \frac{x}{2} \right) dx$$

$$= \int e^x \tan \frac{x}{2} dx + \frac{1}{2} \int e^x \sec^2 \frac{x}{2} dx$$

....(i)

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\therefore \int \tan \frac{x}{2} e^x dx = \left(\tan \frac{x}{2} \right) e^x - \int \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} e^x dx$$

$$= e^x \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} e^x dx$$

यह मान समीकरण (i) में रखने पर

$$= e^x \tan \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} e^x dx + \frac{1}{2} \int e^x \sec^2 \frac{x}{2} dx$$

$$= e^x \tan \frac{x}{2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 19. $e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right).$

हल :

$$\int e^x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \int e^x \cdot \frac{1}{x} dx - \int e^x \cdot \frac{1}{x^2} dx$$

अब $e^x \cdot \frac{1}{x}$ का खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{x} \cdot e^x - \int \frac{-1}{x^2} \cdot e^x dx - \int e^x \cdot \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{1}{x} \cdot e^x + \int \frac{1}{x^2} \cdot e^x dx - \int e^x \cdot \frac{1}{x^2} dx \\ &= \frac{e^x}{x} + C \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 20. $\frac{(x-3)e^x}{(x-1)^3}$.

हल : माना कि

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{(x-3)e^x}{(x-1)^3} dx = \int e^x \left[\frac{x-1-2}{(x-1)^3} \right] dx \\ &= \int e^x \left[\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{2}{(x-1)^3} \right] dx \\ &= \int \frac{1}{(x-1)^2} \cdot e^x dx - \int \frac{2}{(x-1)^3} \cdot e^x dx \end{aligned}$$

यहाँ $e^x \cdot \frac{1}{(x-1)^2} = t$ रखने पर

$$\left\{ e^x \cdot \frac{1}{(x-1)^2} + e^x \cdot \left(\frac{-2}{(x-1)^3} \right) \right\} dx = dt$$

$$\text{या } e^x \left[\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{2}{(x-1)^3} \right] dx = dt$$

$$I = \int dt = t + C = \frac{1}{(x-1)^2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 21. $e^{2x} \sin x$.

हल : मान लीजिए

$$I = \int e^{2x} \sin x dx$$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} I &= e^{2x}(-\cos x) - \int 2e^{2x}.(-\cos x) dx \\ &= -e^{2x} \cos x + 2 \int e^{2x} \cos x dx \end{aligned}$$

पुनः खण्डशः समाकलन करने पर

$$\begin{aligned} I &= -e^{2x} \cos x + 2[e^{2x} \sin x - \int 2e^{2x} \sin x dx] \\ &= -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - 4 \int e^{2x} \sin x dx \end{aligned}$$

$$I = -e^{2x} \cos x + 2e^{2x} \sin x - 4I$$

$$5I = e^{2x} \cdot 2 \sin x - e^{2x} \cos x$$

$$I = \frac{1}{5} e^{2x} (2 \sin x - \cos x) + C.$$

उत्तर

या

∴

प्रश्न 22. $\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right).$

हल : $\int \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) dx$

मान लीजिए $x = \tan \theta$ हो, तब $dx = \sec^2 \theta d\theta$

$$\begin{aligned} &= \int \sin^{-1}\left(\frac{2 \tan \theta}{1+\tan^2 \theta}\right) \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int \sin^{-1}(\sin 2\theta) \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int 2\theta \sec^2 \theta d\theta = 2 \int \theta \sec^2 \theta d\theta \end{aligned}$$

खण्डशः समाकलन करने पर

$$\begin{aligned} &= 2[\theta \tan \theta - \int 1 \cdot \tan \theta d\theta] \\ &= 2[\theta \tan \theta + \log |\cos \theta|] + C \end{aligned}$$

यहाँ $\tan \theta = x, \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ को रखने पर,

$$\begin{aligned} &= 2[x \tan^{-1} x + \log \left| \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right|] + C \\ &= 2x \tan^{-1} x - 2 \cdot \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C \\ &= 2x \tan^{-1} x - \log(1+x^2) + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 23 व 24 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 23. $\int x^2 e^{x^3} dx$ बराबर है—

(A) $\frac{1}{3} e^{x^3} + C$

(C) $\frac{1}{2} e^{x^3} + C$

Banjarpur
(B) $\frac{1}{3} e^{x^2} + C$

(D) $\frac{1}{2} e^{x^2} + C$

हल : $\int x^2 e^{x^3} dx$

$x^3 = t$ रखने पर,

\therefore

$3x^2 dx = dt$

$$= \frac{1}{3} \int e^t dt = \frac{1}{3} e^t + C$$

$$= \frac{1}{3} e^{x^3}$$

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्न 24. $\int e^x \sec x (1 + \tan x) dx$ बराबर है—

(A) $e^x \cos x + C$

(C) $e^x \sin x + C$

(B) $e^x \sec x + C$

(D) $e^x \tan x + C$

हल : $\int e^x \sec x (1 + \tan x) dx = \int e^x \sec x dx + \int e^x \sec x \tan x dx$

अब प्रथम समाकलन में खण्डशः समाकलन का प्रयोग करने पर,

$$= \sec x \int e^x - \int \sec x \tan x \int e^x dx + \int e^x \sec x \tan x dx$$

$$= \sec x \cdot e^x - \int e^x \sec x \tan x dx + \int e^x \cdot \sec x \tan x dx$$

$$= e^x \sec x + C.$$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7.7

प्रश्न 1 से 9 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए—

प्रश्न 1. $\sqrt{4 - x^2}$.

हल :

$$\int \sqrt{4 - x^2} dx$$

$$= \int \sqrt{(2)^2 - x^2} dx$$

$$= \frac{x\sqrt{4 - x^2}}{2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2} + C$$

$$\left[\because \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \text{ से} \right]$$

$$= \frac{x\sqrt{4 - x^2}}{2} + 2 \sin^{-1} \frac{x}{2} + C$$

$$= \frac{1}{2} x \sqrt{4 - x^2} + 2 \sin^{-1} \frac{x}{2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\sqrt{1 - 4x^2}$.

हल :

$$\int \sqrt{1 - 4x^2} dx = 2 \int \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} dx$$

$$= 2 \left[\frac{x}{2} \sqrt{\frac{1}{4} - x^2} + \frac{1}{4 \cdot 2} \sin^{-1} \left(\frac{x}{\frac{1}{2}} \right) \right] + C$$

$$\left[\because \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]$$

$$= x \frac{\sqrt{1 - 4x^2}}{2} + \frac{1}{4} \sin^{-1} 2x + C$$

$$= \frac{x}{2} \sqrt{1 - 4x^2} + \frac{1}{4} \sin^{-1} 2x + C$$

$$= \frac{1}{4} \sin^{-1} 2x + \frac{1}{2} x \sqrt{1 - 4x^2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\sqrt{x^2 + 4x + 6}$.

$$\text{हल : } \int \sqrt{x^2 + 4x + 6} dx = \int \sqrt{x^2 + 4x + 4 + 2} dx = \int \sqrt{(x+2)^2 + 2} dx$$

$$= \frac{(x+2)\sqrt{(x+2)^2 + 2}}{2}$$

$$+ \frac{2}{2} \log |(x+2) + \sqrt{(x+2)^2 + 2}| + C$$

$$\left[\because \int \sqrt{x^2 + a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}| \text{ से} \right]$$

$$= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{x^2 + 4x + 6}$$

$$+ \log |(x+2) + \sqrt{x^2 + 4x + 6}| + C. \text{ उत्तर}$$

प्रश्न 4. $\sqrt{x^2 + 4x + 1}$.

$$\text{हल : } \int \sqrt{x^2 + 4x + 1} dx = \int \sqrt{x^2 + 4x + 4 - 3} dx$$

$$= \int \sqrt{(x+2)^2 - 3} dx$$

$$= \frac{(x+2)\sqrt{(x+2)^2 - 3}}{2}$$

$$- \frac{3}{2} \log |(x+2) + \sqrt{(x+2)^2 - 3}| + C$$

$$\left[\because \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right]$$

$$= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{x^2 + 4x + 1}$$

$$- \frac{3}{2} \log |(x+2)\sqrt{x^2 + 4x + 1}| + C. \text{ उत्तर}$$

प्रश्न 5. $\sqrt{1 - 4x - x^2}$.

$$\text{हल : } \int \sqrt{1 - 4x - x^2} dx = \int \sqrt{1 - (x^2 + 4x + 4) + 4} dx$$

$$= \int \sqrt{5 - (x+2)^2} dx$$

$$= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{5 - (x+2)^2} + \frac{5}{2} \sin^{-1} \frac{x+2}{\sqrt{5}} + C$$

$$\left[\because \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right]$$

$$= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{1 - 4x - x^2} + \frac{5}{2} \sin^{-1} \frac{x+2}{\sqrt{5}} + C$$

$$= \frac{5}{2} \sin^{-1} \left(\frac{x+2}{\sqrt{5}} \right) + \frac{x+2}{2} \sqrt{1 - 4x - x^2} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 6. $\sqrt{x^2 + 4x - 5}$.

हल :

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 + 4x - 5} dx &= \int \sqrt{x^2 + 4x + 4 - 9} dx \\ &= \int \sqrt{(x+2)^2 - 9} dx \\ &= \int \sqrt{(x+2)^2 - (3)^2} dx \\ &\left[\because \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \int \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \log|x + \sqrt{x^2 - a^2}| \right] \\ &= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{(x+2)^2 - 9} \\ &= \frac{1}{2}(x+2)\sqrt{x^2 + 4x - 5} \\ &- \frac{9}{2} \log|(x+2) + \sqrt{(x+2)^2 - 9}| + C \end{aligned}$$

प्रश्न 7. $\sqrt{1 + 3x - x^2}$.

हल :

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1 + 3x - x^2} dx &= \int \sqrt{1 - \left(x^2 - 3x + \frac{9}{4}\right) + \frac{9}{4}} dx \\ &= \int \sqrt{\frac{13}{4} - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2} dx \\ &= \frac{1}{2} \left(x - \frac{3}{2}\right) \sqrt{\frac{13}{4} - \left(x - \frac{3}{2}\right)^2} + \frac{13}{8} \sin^{-1} \frac{x - \frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{13}{4}}} + C \\ &\left[\because \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x\sqrt{a^2 - x^2}}{2} + \frac{a^2}{2} \sin^{-1} \frac{x}{a} \right] \\ &= \frac{2x - 3}{4} \sqrt{1 + 3x - x^2} + \frac{13}{8} \sin^{-1} \left(\frac{2x - 3}{\sqrt{13}} \right) + C. \quad \text{उत्तर} \end{aligned}$$

प्रश्न 8. $\sqrt{x^2 + 3x}$.

हल :

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 + 3x} dx &= \int \sqrt{x^2 + 3x + \frac{9}{4} - \frac{9}{4}} dx \\ &= \int \sqrt{\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4}} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{2} \right) \sqrt{\left(x + \frac{3}{2} \right)^2 - \frac{9}{4}} \\
 &\quad - \frac{9}{8} \log \left| \left(x + \frac{3}{2} \right) + \sqrt{\left(x + \frac{3}{2} \right)^2 - \frac{9}{4}} \right| + C \\
 \left[\because \int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \int \frac{x\sqrt{x^2 - a^2}}{2} - \frac{a^2}{2} \log \left| \left(x + \sqrt{x^2 - a^2} \right) \right| \right] \\
 &= \frac{2x+3}{4} \sqrt{x^2 + 3x} - \frac{9}{8} \log \left| x + \frac{3}{2} + \sqrt{x^2 + 3x} \right| + C. \text{ उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 9. $\sqrt{1 + \frac{x^2}{9}}$.

हल :

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1 + \frac{x^2}{9}} dx &= \int \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} dx \\
 &= \frac{1}{3} \int \sqrt{x^2 + 9} dx \\
 \because \int \sqrt{x^2 + a^2} dx &= \int \frac{x\sqrt{x^2 + a^2}}{2} + \frac{a}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}| \\
 &= \frac{1}{3} \left[\frac{x\sqrt{x^2 + 9}}{2} + \frac{3}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + 9}| \right] + C \\
 &= \frac{1}{6} x \sqrt{x^2 + 9} + \frac{3}{2} \log |x + \sqrt{x^2 + 9}| + C. \text{ उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 10 व 11 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 10. $\int \sqrt{1+x^2} dx$ बराबर है—

- (A) $\frac{x}{2} \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2} \log |x + \sqrt{1+x^2}| + C$ (B) $\frac{2}{3} (1+x^2)^{3/2} + C$
 (C) $\frac{2}{3} x (1+x^2)^{3/2} + C$
 (D) $\frac{x^2}{2} \sqrt{1+x^2} + \frac{x^2}{2} \log |x + \sqrt{1+x^2}| + C$

हल :

$$\int \sqrt{1+x^2} dx = \int \sqrt{(1)^2 + x^2} dx$$

$$\begin{aligned}
 \text{सूत्रानुसार, } \int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{a^2 + x^2}| + C \\
 &= \frac{x}{2} \sqrt{1+x^2} + \frac{1}{2} \log |x + \sqrt{1+x^2}| + C
 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्न 11. $\int \sqrt{x^2 - 8x + 7} dx$ बराबर है—

- (A) $\frac{1}{2}(x-4)\sqrt{x^2 - 8x + 7} + 9 \log |x-4 + \sqrt{x^2 - 8x + 7}| + C$
- (B) $\frac{1}{2}(x+4)\sqrt{x^2 - 8x + 7} + 9 \log |x+4 + \sqrt{x^2 - 8x + 7}| + C$
- (C) $\frac{1}{2}(x-4)\sqrt{x^2 - 8x + 7} - 3\sqrt{2} \log |x-4 + \sqrt{x^2 - 8x + 7}| + C$
- (D) $\frac{1}{2}(x-4)\sqrt{x^2 - 8x + 7} - \frac{9}{2} \log |x-4 + \sqrt{x^2 - 8x + 7}| + C$

हल :

$$\int \sqrt{x^2 - 8x + 7} dx = \int \sqrt{x^2 - 8x + 16 + 7 - 16} dx \\ = \int \sqrt{(x-4)^2 - 9} dx$$

अब सूत्र $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \log |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$ के प्रयोग से,

$$= \frac{x-4}{2} \sqrt{x^2 - 8x + 7} - \frac{9}{2} \log |(x-4) + \sqrt{x^2 - 8x + 7}| + C$$

अतः विकल्प (D) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7.8

योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए—

प्रश्न 1. $\int_a^b x dx$

हल : यहाँ

$$f(x) = x \text{ और } b-a = nh$$

$$f(x) = x, f(a+h) = a+h, f(a+2h) = a+2h, \dots,$$

$$f(a+n-1)h = a+(n-1)h$$

$$\therefore \int_a^b x dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[a + (a+h) + (a+2h) + (a+3h) + \dots + (a+n-1)h] \\ = \lim_{h \rightarrow 0} h[n a + h(1+2+3+\dots+n-1)] \\ = \lim_{h \rightarrow 0} h \left[n a + h \times \frac{n(n-1)}{2} \right] \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \left[(nh)a + \frac{(nh)(nh-h)}{2} \right] \\ = \frac{(b-a)a + (b-a)(b-a-0)}{2} - \frac{2ab - 2a^2 + b^2 + a^2 - 2ab}{2} \\ = \frac{b^2 - a^2}{2}.$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\int_0^5 (x+1) dx.$

हल : $\int_0^5 (x+1) dx$

दिया है :

$$f(x) = x + 1, a = 0, b = 5$$

$$\therefore \begin{aligned} f(a) &= a + 1, f(a+h) = a + h + 1 \\ f(a+2h) &= a + 2h + 1 \end{aligned}$$

$$f(a + \overline{n-1}h)] = a + \overline{h-1}h + 1$$

$$nh = b - a = 5 - 0 = 5$$

$$\therefore \int_0^5 (x+1) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h(a+1) + (a+h+1) + (a+2h+1) + \dots$$

$$+ (a + \overline{n-1} + 1)]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} h[n(a+1) + h(1+2+3+\dots+\overline{n-1})]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} h \left[n(a+1) + h \cdot \frac{(n-1)n}{2} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow \infty} \left[nh(a+1) + \frac{(nh-h)nh}{2} \right] \quad [a = 0 \text{ तथा}]$$

$$= 5 \times 1 + \frac{5 \times 5}{2} = 5 + \frac{25}{2} = \frac{35}{2}. \quad [nh = 5]$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\int_2^3 x^2 dx.$

हल :

$$\int_2^3 x^2 dx$$

यहाँ $nh = 3 - 2 = 1$ और $f(x) = x^2, a = 2, b = 3$

$$f(x) = x^2, f(2) = 2^2, f(2+h) = (2+h)^2$$

$$f(2+2h) = (2+2h)^2, \dots, f(2 + \overline{n-1}h) = [2 + (n-1)h]^2$$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots$$

$$+ f(a + \overline{n-1}h)]$$

$$\int_2^3 x^2 dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[2^2 + (2+h)^2 + (2+2h)^2 + (2+3h)^2 + \dots]$$

$$+ (2 + \overline{n-1}h)^2]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} h\{2^2 + (2^2 + 2.2h + h^2)$$

$$+[2^2 + 2(2.2h) + (2h)^2] + [2^2 + 2(2.3h) + (3h)^2] + \dots$$

$$+ [2^2 + 2.2(n-1)h + (\overline{n-1}h)^2]\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} h\{[n \cdot 2^2 + 4h(1+2+3+\dots+\overline{n-1})]$$

$$+ h^2[1+2^2+3^2+\dots+(n-1)^2]\}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[nh \cdot 2^2 + 4h \cdot \frac{(n-1)n}{2} + h^2 \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[nh \cdot 4 + \frac{4}{2} \cdot (nh - h)nh + \frac{(nh - h)(nh)(2nh - h)}{6} \right] \\
 &= 1 \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1 \cdot 1 \cdot 2}{6} = 6 + \frac{1}{3} = \frac{19}{3}. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 4. $\int_1^4 (x^2 - x) dx.$

हल : $\int_1^4 (x^2 - x) dx$

यहाँ $a = 1, b = 4, f(x) = x^2 - x, nh = b - a = 4 - 1 = 3$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int_1^4 (x^2 - x) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} h[f(1) + f(1 + h) + f(1 + 2h) + \dots \\
 &\quad + f\{(1 + (n - 1)h\}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} h[(1 - 1) + \{(1 + h)^2 - (1 + h)\} \\
 &\quad + \{(1 + 2h)^2 - (1 + 2h)\} + \dots \\
 &\quad + \{(1 + (n - 1)h)\}^2 - \{1 + (n - 1)h\}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} h[(1 + h^2 + 2h - 1 - h) \\
 &\quad + (1 + 4h^2 + 4h - 1 - 2h) + \dots \\
 &\quad + \{1 + (n - 1)^2h^2 + 2(n - 1)h - 1 - (n - 1)h\}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} h[(h^2 + h) + (4h^2 + 2h) + \dots \\
 &\quad + \{(n - 1)h^2 + (n - 1)h\}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} h[h^2(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n - 1)^2 \\
 &\quad + h\{1 + 2 + 3 + \dots + (n - 1)\})] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[h^3 \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} + h^2 \frac{n(n-1)}{2} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{nh(nh-h)(2nh-h)}{6} + \frac{nh(nh-h)}{2} \right] \\
 &= \frac{3 \cdot (3-0)(6-0)}{6} + \frac{3(3-0)}{2} \\
 &= 9 + \frac{9}{2} = \frac{27}{2}. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 5. $\int_{-1}^1 e^x dx.$

हल : $\int_{-1}^1 e^x dx$

जबकि $\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[f(a) + f(a + 2h) + f(a + 3h) + \dots + (a + \overline{n-1}h)]$

दिया है : $a = -1, b = 1, b - a = 2 = nh$

$$\begin{aligned}
 f(a) &= e^x \\
 f(-1) &= e^{-1}, f(-1 + h) = e^{-1+h} \\
 f(-1 + 2h) &= e^{-1+2h} \\
 f(-1 + \overline{n-1}h) &= e^{-1+\overline{n-1}h}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 e^x dx &= \lim_{h \rightarrow 0} h[e^{-1} + e^{-1+h} + e^{-1+2h} + \dots + e^{-1+\overline{n-1}h}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} he^{-1}[1 + e^h + e^{2h} + \dots + e^{(n-1)h}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} he^{-1} \left[\frac{1 - e^{nh}}{1 - e^h} \right] \\
 &\quad \left[\because a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r} \text{ से} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} e^{-1} \frac{(1 - e^{nh})}{\left(\frac{e^h - 1}{h} \right)} = \frac{-e^{-1}(1 - e^2)}{1} \\
 &\quad \left[\because nh = 2, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1 \right]
 \end{aligned}$$

प्रश्न 6. $\int_0^4 (x + e^{2x}) dx.$

हल : हमें जात है :

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+(n-1)h)]$$

यहाँ $nh = b - a$

दिया है : $a = 0, b = 4, nh = 4 - 0 = 4$

$$\begin{aligned}
 \therefore \int_0^4 (x + e^{2x}) dx &= \lim_{h \rightarrow 0} h[f(0) + f(0+h) + f(0+2h) + \dots \\
 &\quad + f(0+(n-1)h)] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} h[(0 + e^0) + (h + e^{2h}) + (2h + e^{2(2h)}) + \dots \\
 &\quad + (n-1)h + e^{2(n-1)h}] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} h[(1 + 2 + 3 + \dots + (n-1)) \\
 &\quad + (1 + e^{2h} + e^{2(2h)} + \dots + e^{2(n-1)h})] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[h^2 \cdot \frac{n(n-1)}{2} + h \cdot \frac{1(1 - e^{2n})}{1 - e^{2h}} \right] \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{nh(nh-h)}{2} + \frac{1}{1 - e^{2h}} \cdot \frac{1 - e^{2nh}}{2h} \right] \\
 &\quad \left[\because \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{2h} - 1}{2h} = 1 \right] \\
 &= \frac{4(4-0)}{2} - \frac{1}{2}(1 - e^8) = 8 - \frac{1}{2}(1 - e^8) \\
 &= \frac{15}{2} + \frac{e^8}{2} = \frac{1}{2}(15 + e^8).
 \end{aligned}$$

उत्तर

उत्तर

प्रश्नावली 7.9

प्रश्न 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए—

प्रश्न 1. $\int_{-1}^1 (x + 1) dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 (x + 1) dx &= \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_1^1 = \left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\int_2^3 \frac{1}{x} dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\int_2^3 \frac{1}{x} dx = [\log x]_2^3 = \log 3 - \log 2 = \log \frac{3}{2}.$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\int_1^2 (4x^3 - 5x^2 + 6x + 9) dx.$

हल : ज्ञात है : $\int_1^2 (4x^3 - 5x^2 + 6x + 9) dx$

$$\begin{aligned}&= \left[4 \cdot \frac{x^4}{4} - 5 \cdot \frac{x^3}{3} + 6 \cdot \frac{x^2}{2} + 9x \right]_1^2 \\ &= \left[x^4 - \frac{5}{3}x^3 + 3x^2 + 9x \right]_1^2 \\ &= \left[\left(16 - \frac{5}{3} \times 8 + 3 \times 4 + 9 \times 2 \right) - \left(1 - \frac{5}{3} + 3 + 9 \right) \right] \\ &= \left[16 - \frac{40}{3} + 12 + 18 \right] - \left[13 - \frac{5}{3} \right] \\ &= \left[46 - \frac{40}{3} \right] - \left[13 - \frac{5}{3} \right] = 33 - \frac{40}{3} + \frac{5}{3} \\ &= 33 - \frac{35}{3} = \frac{99 - 35}{3} = \frac{64}{3}.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 4. $\int_0^{\pi/4} \sin 2x dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \sin 2x dx &= -\frac{1}{2} [\cos 2x]_0^{\pi/4} \\ &= -\frac{1}{2} [0 - 1] = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 5. $\int_0^{\pi/2} \cos 2x dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \cos 2x \, dx &= \frac{1}{2} [\sin 2x]_0^{\pi/2} = \frac{1}{2} [\sin 2 \times \frac{\pi}{2} - \sin 0] \\ &= \frac{1}{2} [\sin \pi - 0] = \frac{1}{2} (0 - 0) = 0.\end{aligned}$$
उत्तर

प्रश्न 6. $\int_4^5 e^x \, dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\int_4^5 e^x \, dx = [e^x]_4^5 = e^5 - e^4 = e^4(e - 1).$$
उत्तर

प्रश्न 7. $\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/4} \tan x \, dx &= [\log \cos x]_0^{\pi/4} \\ &= -\left[\log \cos \frac{\pi}{4} - \log \cos 0 \right] \\ &= -\left[\log \frac{1}{\sqrt{2}} - 0 \right] = \log \sqrt{2} = \log(2)^{1/2} = \frac{1}{2} \log 2.\end{aligned}$$
उत्तर

प्रश्न 8. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \operatorname{cosec} x \, dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_{\pi/6}^{\pi/4} \operatorname{cosec} x \, dx &= [\log (\operatorname{cosec} x - \cot x)]_{\pi/6}^{\pi/4} \\ &= \log \left(\operatorname{cosec} \frac{\pi}{4} - \cot \frac{\pi}{4} \right) - \log \left(\operatorname{cosec} \frac{\pi}{6} - \cot \frac{\pi}{6} \right) \\ &= \log (\sqrt{2} - 1) - \log (2 - \sqrt{3}) \\ &= \log \left(\frac{\sqrt{2} - 1}{2 - \sqrt{3}} \right).\end{aligned}$$
उत्तर

प्रश्न 9. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} &= [\sin^{-1} x]_0^1 = \sin^{-1} 1 - \sin^{-1} 0 \\ &= \sin^{-1} \left(\sin \frac{\pi}{2} \right) - \sin^{-1} (\sin 0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$
उत्तर

प्रश्न 10. $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}.$

हल : हमें ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} &= \left| \tan^{-1} x \right|_0^1 = \tan^{-1} 1 - \tan^{-1} 0 \\ &= \tan^{-1} \left(\tan \frac{\pi}{4} \right) - \tan^{-1} (\tan 0) = \frac{\pi}{4} - 0 = \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$
उत्तर

प्रश्न 11. $\int_2^3 \frac{dx}{x^2 - 1}$.

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned} \int_2^3 \frac{dx}{x^2 - 1} &= \frac{1}{2} \left[\log \frac{x-1}{x+1} \right]_2^3 = \frac{1}{2} \left[\log \frac{2}{4} - \log \frac{1}{3} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\log \left(\frac{1}{2} \times \frac{3}{1} \right) \right] = \frac{1}{2} \log \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 12. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx$.

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx \quad \dots(i)$$

$$= \int_0^{\pi/2} \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx \quad \left[\because \int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx \right]$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 x \, dx + \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx \\ &= \int_0^{\pi/2} (\cos^2 x + \sin^2 x) \, dx \\ &= \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = [x]_0^{\pi/2} \\ 2I &= \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

\therefore

$$I = \frac{\pi}{4}.$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\int_2^3 \frac{x \, dx}{x^2 + 1}$.

हल : ज्ञात है : $\int_2^3 \frac{x \, dx}{x^2 + 1}$ मान लीजिए $x^2 + 1 = t$ हो, तब $\therefore 2x \, dx = dt$

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} \, dx = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} \log t = \frac{1}{2} \log (x^2 + 1)$$

$$\therefore \int_2^3 \frac{x \, dx}{x^2 + 1} = \frac{1}{2} \left[\log (x^2 + 1) \right]_2^3$$

$$= \frac{1}{2} [\log (3^2 + 1) - \log (2^2 + 1)]$$

$$= \frac{1}{2} [\log 10 - \log 5]$$

$$= \frac{1}{2} \log \frac{10}{5} = \frac{1}{2} \log 2.$$

उत्तर

Baniapur

प्रश्न 14. $\int_0^1 \frac{2x+3}{5x^2+1} dx.$

हल : ज्ञात है : $\int_0^1 \frac{2x+3}{5x^2+1} dx$

$$\begin{aligned}\int \frac{2x+3}{5x^2+1} dx &= \frac{1}{5} \int \frac{10x}{5x^2+1} dx + 3 \int \frac{1}{5x^2+1} dx \\ &= \frac{1}{5} \int \frac{10x}{5x^2+1} dx + \frac{3}{5} \int \frac{1}{x^2 + \frac{1}{5}} dx\end{aligned}$$

प्रथम समाकलन में माना $5x^2 + 1 = t$ तब $\therefore 10x dx = dt$

$$= \frac{1}{5} \int \frac{dt}{t} + \frac{3}{5} \int \frac{1}{(x^2) + \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} dx$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{5} \log t + \frac{3}{5} \times \sqrt{5} \tan^{-1} \left(\frac{x}{1/\sqrt{5}} \right) \\ &= \frac{1}{5} \log (5x^2 + 1) + \frac{3}{\sqrt{5}} \tan^{-1} (x\sqrt{5}) \\ \therefore \int_0^1 \frac{2x+3}{5x^2+1} dx &= \left[\frac{1}{5} \log (5x^2 + 1) + \frac{3}{\sqrt{5}} \tan^{-1} (\sqrt{5}x) \right]_0^1 \\ &= \left[\frac{1}{5} \log (5+1) + \frac{3}{\sqrt{5}} \tan^{-1} (\sqrt{5}) \right] \\ &\quad - \left[\frac{1}{5} \log (0+1) + \frac{3}{\sqrt{5}} \tan^{-1} 0 \right]\end{aligned}$$

$= \frac{1}{5} \log 6 + \frac{3}{\sqrt{5}} \tan^{-1} \sqrt{5}.$

($\because \log 1 = 0$) उत्तर

प्रश्न 15. $\int_0^1 xe^{x^2} dx.$

हल : $\int xe^{x^2} dx$, मान लीजिए $x^2 = t$ तब $2x dx = t dt$

$$= \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^t = \frac{1}{2} e^{x^2}$$

$$\therefore \int_0^1 xe^{x^2} dx = \left| \frac{1}{2} e^{x^2} \right|_0^1 = \frac{1}{2} e^1 - \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2} (e-1).$$

उत्तर

प्रश्न 16. $\int_1^2 \frac{5x^2}{x^2 + 4x + 3} dx.$

हल : $\int \frac{5x^2}{x^2 + 4x + 3} dx$

$5x^2$ को $x^2 + 4x + 3$ से भाग देने पर,

$$\therefore \frac{5x^2}{x^2 + 4x + 3} = 5 - \frac{20x + 15}{x^2 + 4x + 3}$$

$$\text{अब } \frac{20x + 15}{x^2 + 4x + 3} = \frac{20x + 15}{(x+3)(x+1)} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x+1}$$

$$\therefore 20x + 15 = A(x+1) + B(x+3)$$

$x = -3$ लेने पर,

$$-60 + 15 = A(-2)$$

$$A = \frac{45}{2}$$

तथा $x = -1$ लेने पर,

$$-20 + 15 = B \times 2$$

$$B = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore \frac{20x + 15}{x^2 + 4x + 3} = \frac{45}{2(x+3)} - \frac{5}{2(x+1)}$$

$$\int \frac{5x^2}{x^2 + 4x + 3} dx = \int \left[5 - \frac{45}{2(x+3)} + \frac{5}{2(x+1)} \right] dx$$

$$= 5x - \frac{45}{2} \log|x+3| + \frac{5}{2} \log|x+1|$$

$$\therefore \int_1^2 \frac{5x^2}{x^2 + 4x + 3} dx = \left[5x - \frac{45}{2} \log|x+3| + \frac{5}{2} \log|x+1| \right]_1^2$$

$$= \left[\left(10 - \frac{45}{2} \log 5 + \frac{5}{2} \log 3 \right) - \left(5 - \frac{45}{2} \log 4 + \frac{5}{2} \log 2 \right) \right]$$

$$= 5 - \frac{45}{2} \log \frac{5}{4} + \frac{5}{2} \log \frac{3}{2}$$

$$= 5 - \frac{5}{2} \left(9 \log \frac{5}{4} - \log \frac{3}{2} \right).$$

उत्तर

प्रश्न 17. $\int_0^{\pi/4} (2 \sec^2 x + x^3 + 2) dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\int_0^{\pi/4} (2 \sec^2 x + x^3 + 2) dx = 2 \int_0^{\pi/4} \sec^2 x dx + \int_0^{\pi/4} x^3 dx + 2 \int_0^{\pi/4} dx$$

$$= \left[2 \tan x + \frac{x^4}{4} + 2x \right]_0^{\pi/4}$$

$$= \left(2 \tan \frac{\pi}{4} + \frac{\pi^4}{1024} + \frac{\pi}{2} \right) - 0$$

$$= 2 + \frac{\pi^4}{1024} + \frac{\pi}{2}$$

$$= \frac{\pi^4}{1024} + \frac{\pi}{2} + 2.$$

उत्तर

प्रश्न 18. $\int_0^\pi \left(\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} \right) dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \left(\sin^2 \frac{x}{2} - \cos^2 \frac{x}{2} \right) dx &= - \int_0^\pi \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) dx \\ &= - \int_0^\pi \cos x dx = - [\sin x]_0^\pi \\ &= - [\sin \pi + \sin 0] = 0.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 19. $\int_0^2 \frac{6x+3}{x^2+4} dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{6x+3}{x^2+4} dx &= 3 \int_0^2 \frac{2x}{x^2+4} dx + 3 \int_0^2 \frac{dx}{x^2+4} \\ &= \left[3 \log |x^2+4| + 3 \times \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} \right]_0^2 \\ &= \left(3 \log 8 + \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{2}{2} \right) - \left(3 \log 4 + \frac{3}{2} \tan^{-1} 0 \right) \\ &= 3 \log \frac{8}{4} + \frac{3}{2} \tan^{-1} 1 \\ &= 3 \log 2 + \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} \\ &= 3 \log 2 + \frac{3\pi}{8}.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 20. $\int_0^1 \left(xe^x + \sin \frac{\pi x}{4} \right) dx.$

हल : ज्ञात है :

$$\begin{aligned}\int_0^1 \left(xe^x + \sin \frac{\pi x}{4} \right) dx &= \int_0^1 xe^x dx + \int_0^1 \sin \frac{\pi x}{4} dx \\ &= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx + \int_0^1 \sin \frac{\pi x}{4} dx \\ &= [1 \cdot e - 0] - [e^x]_0^1 - \frac{4}{\pi} \left[\cos \pi \frac{x}{4} \right]_0^1 \\ &= e - (e - 1) - \frac{4}{\pi} \left(\cos \frac{\pi}{4} - \cos 0 \right) \\ &= 1 - \frac{4}{\pi} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} - 1 \right)\end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} + \frac{4}{\pi}$$

$$= 1 + \frac{4}{\pi} - \frac{2\sqrt{2}}{\pi}.$$

उत्तर

प्रश्न 21 एवं 22 में सही उत्तर का चयन कीजिए—

प्रश्न 21. $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$ बराबर है :

- (A) $\frac{\pi}{3}$
- (B) $\frac{2\pi}{3}$
- (C) $\frac{\pi}{6}$
- (D) $\frac{\pi}{12}$

हल :

$$\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = [\tan^{-1} x]_1^{\sqrt{3}}$$

$$= \tan^{-1}(\sqrt{3}) - \tan^{-1}(1)$$

$$= \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

उत्तर

अतः विकल्प (D) सही है।

प्रश्न 22. $\int_0^{2/3} \frac{dx}{4+9x^2}$ बराबर है :

- (A) $\frac{\pi}{6}$
- (B) $\frac{\pi}{12}$
- (C) $\frac{\pi}{24}$
- (D) $\frac{\pi}{4}$

हल :

$$\int_0^{2/3} \frac{dx}{4+9x^2} = \frac{1}{9} \int_0^{2/3} \frac{dx}{\frac{4}{9} + x^2}$$

$$= \frac{1}{9} \int_0^{2/3} \frac{dx}{\left(\frac{2}{3}\right)^2 + x^2}$$

$$= \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2/3} \left[\tan^{-1} \frac{x}{2/3} \right]_0^{2/3}$$

$$= \frac{1}{9} \times \frac{3}{2} \left[\tan^{-1} \frac{3x}{2} \right]_0^{2/3}$$

$$= \frac{1}{6} \left[\tan^{-1} \frac{3}{2} \times \frac{2}{3} - \tan^{-1} 0 \right]$$

$$= \frac{1}{6} \left[\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(0) \right] = \frac{1}{6} \left[\frac{\pi}{4} - 0 \right] = \frac{\pi}{24}$$

उत्तर

अतः विकल्प (C) सही है।

प्रश्नावली 7.10

प्रश्न 1 से 8 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए—

प्रश्न 1. $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx$

हल : दिया है : $\int_0^1 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$

मान लीजिए $x^2 + 1 = t$ हो, तब $\therefore 2x dx = dt$

अतः

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{dt}{t} = \frac{1}{2} [\log t]_1 \\ &= \frac{1}{2} (\log 2 - \log 1) \\ &= \frac{1}{2} \log 2.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \phi} \cos^5 \phi d\phi$

हल : $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \phi} \cos^5 \phi d\phi = \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \phi} \cos^4 \phi \cos \phi d\phi$
 $= \int_0^{\pi/2} \sqrt{\sin \phi} (1 - \sin^2 \phi)^2 \cos \phi d\phi$

मान लीजिए $\sin \phi = t$ हो, तो $\cos \phi d\phi = dt$ यदि $\phi = \frac{\pi}{2}, t = 1$ तथा यदि $\phi = 0, t = 0$

$$\begin{aligned}&= \int_0^1 \sqrt{t} (1 - t^2)^2 dt = \int_0^1 \sqrt{t} (1 - 2t^2 + t^4) dt \\ &= \int_0^1 (\sqrt{t} - 2t^{5/2} + t^{9/2}) dt\end{aligned}$$

$$\left[\frac{2}{3}t^{3/2} - 2 \cdot \frac{2}{7}t^{7/2} + \frac{2}{11}t^{11/2} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{4}{7} + \frac{2}{11} = \frac{154 - 132 + 42}{231} = \frac{64}{231}.$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\int_0^1 \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) dx$

हल : $\int_0^1 \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right) dx$

मान लीजिए $x = \tan \theta$ हो, तब $\therefore dx = \sec^2 \theta d\theta$

यदि $x = 1, \theta = \frac{\pi}{4}$ तथा यदि $x = 0; \theta = 0$

$$\begin{aligned}&= \int_0^{\pi/4} \sin^{-1} \left(\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} \right) \sec^2 \theta d\theta \\ &= \int_0^{\pi/4} \sin^{-1} (\sin 2\theta) \sec^2 \theta d\theta\end{aligned}$$

$$= \int_0^{\pi/4} 2\theta \sec^2 \theta d\theta = 2 \int_0^{\pi/4} \theta \sec^2 \theta d\theta$$

अब खण्डशः समाकलन करने पर,

$$\begin{aligned} I &= 2[\theta \cdot \tan \theta]_0^{\pi/4} - 2 \int_0^{\pi/4} 1 \cdot \tan \theta d\theta \\ &= 2 \left[\frac{\pi}{4} \tan \frac{\pi}{4} - 0 \right] + 2 \left[[\log \cos \theta]_0^{\pi/4} \right] \\ &= 2 \left[\frac{\pi}{4} + \log \cos \frac{\pi}{4} - \log \cos 0 \right] \\ &= 2 \left[\frac{\pi}{4} + \log \frac{1}{\sqrt{2}} - \log 1 \right] \\ &= \frac{\pi}{2} - 2 \log \sqrt{2} = \frac{\pi}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} \log 2 = \frac{\pi}{2} - \log 2. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 4. $\int_0^2 x \sqrt{x+2} dx$

हल : $\int_0^2 x \sqrt{x+2} dx$, मान लीजिए $x+2 = t^2$ हो, तब $dx = 2t dt$

$x = t^2 - 2$, यदि $x = 2$, $t = 2$, यदि $x = 0$, $t = \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} &= \int_{\sqrt{2}}^2 (t^2 - 2)t \cdot 2t dt = 2 \int_{\sqrt{2}}^2 (t^4 - 2t^2) dt \\ &= 2 \left[\frac{t^5}{5} - 2 \cdot \frac{t^3}{3} \right]_{\sqrt{2}}^2 \\ &= 2 \left[\left(\frac{32}{5} - \frac{2}{3} \times 8 \right) - \left(\frac{(\sqrt{2})^5}{5} - \frac{2}{3} (\sqrt{2})^3 \right) \right] \\ &= 2 \left[\left(\frac{32}{5} - \frac{16}{3} \right) - \left(\frac{4\sqrt{2}}{5} - \frac{4\sqrt{2}}{3} \right) \right] \\ &= \frac{64}{5} - \frac{32}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{5} + \frac{8\sqrt{2}}{3} \\ &= \frac{192 - 160}{15} + \frac{8\sqrt{2}}{15} (5 - 3) \\ &= \frac{32}{15} + \frac{16\sqrt{2}}{15} = \frac{16}{15} (2 + \sqrt{2}) = \frac{16\sqrt{2}}{15} (\sqrt{2} + 1). \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 5. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

हल : $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$

मान लीजिए $\cos x = t$ हो, तब $-\sin x dx = dt$

जब $x = \frac{\pi}{2}$, $t = 0$, और जब $x = 0$, $t = 1$

$$= -\int_1^0 \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} = |\tan^{-1} t|_0^1$$

$$= \tan^{-1} 1 - 0 = \frac{\pi}{4}.$$

उत्तर

प्रश्न 6. $\int_0^2 \frac{dx}{x+4-x^2}$

हल :

$$\int_0^2 \frac{dx}{x+4-x^2} = \int_0^2 \frac{dx}{4-(x^2-x+\frac{1}{4})+\frac{1}{4}}$$

$$= \int_0^2 \frac{dx}{\frac{17}{4}-\left(x-\frac{1}{2}\right)^2} \quad \left[\because \int \frac{dx}{a^2-x^2} = \frac{1}{2a} \log \frac{a+x}{a-x} \text{ से} \right]$$

$$= \frac{1}{2 \cdot \frac{\sqrt{17}}{2}} \left(\log \frac{\frac{\sqrt{17}}{2} + \left(x - \frac{1}{2}\right)}{\frac{\sqrt{17}}{2} - \left(x - \frac{1}{2}\right)} \right)_0^2$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \left[\log \left(\frac{\frac{\sqrt{17}}{2} + \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2} - \frac{3}{2}} \right) - \log \left(\frac{\frac{\sqrt{17}}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{17}}{2} + \frac{1}{2}} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \left[\log \frac{\sqrt{17} + 3}{\sqrt{17} - 3} - \log \frac{\sqrt{17} - 1}{\sqrt{17} + 1} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \log \left(\frac{\sqrt{17} + 3}{\sqrt{17} - 3} \times \frac{\sqrt{17} + 1}{\sqrt{17} - 1} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \log \left(\frac{20 + 4\sqrt{17}}{20 - 4\sqrt{17}} \right) = \frac{1}{\sqrt{17}} \log \left(\frac{5 + \sqrt{17}}{5 - \sqrt{17}} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \log \left(\frac{5 + \sqrt{17}}{5 - \sqrt{17}} \times \frac{5 + \sqrt{17}}{5 + \sqrt{17}} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \log \frac{(5 + \sqrt{17})^2}{25 - 17}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{17}} \log \left(\frac{42 + 10\sqrt{17}}{8} \right) = \frac{1}{\sqrt{17}} \log \left(\frac{21 + 5\sqrt{17}}{4} \right).$$

उत्तर

प्रश्न 7. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 5}$

हल :

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 + 2x + 5} = \int_{-1}^1 \frac{dx}{(x+1)^2 + 4}$$

$$\therefore \int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1} \frac{x}{a}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\tan^{-1} \frac{x+1}{2} \right) \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{1}{2} [\tan^{-1} 1 - \tan^{-1} 0]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\tan^{-1} \left(\tan \frac{\pi}{4} \right) - 0 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}$$

उत्तर

प्रश्न 8. $\int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} \right) e^{2x} dx$

हल :

$$\int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} \right) e^{2x} dx$$

$$= \int_1^2 \left(e^{2x} \cdot \frac{1}{x} - e^{2x} \cdot \frac{1}{2x^2} \right) dx$$

$$= \int_1^2 \frac{e^{2x}}{x} dx - \int_1^2 \frac{e^{2x}}{2x^2} dx$$

प्रथम भाग का खण्डशः समाकलन करने पर,

$$= \left[\frac{1}{x} \cdot \frac{e^{2x}}{2} \right]_1^2 - \int_1^2 \left(-\frac{1}{x^2} \right) \cdot \frac{e^{2x}}{2} dx - \int_1^2 \frac{e^{2x}}{2x^2} dx$$

$$= \left(\frac{e^4}{4} - \frac{e^2}{2} \right) + \int_1^2 \frac{e^{2x}}{2x^2} dx - \int_1^2 \frac{e^{2x}}{2x^2} dx$$

$$= \left(\frac{e^4}{4} - \frac{e^2}{4} \right) = \frac{e^2}{4} (e^2 - 2)$$

उत्तर

प्रश्न 9 एवं 10 में सही उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न 9. समाकलन $\int_{1/3}^1 \frac{(x - x^3)^{1/3}}{x^4} dx$ का मान है :

(A) 6

(B) 0

(C) 3

(D) 4

हल :

$$\int_{1/3}^1 \frac{(x - x^3)^{1/3}}{x^4} dx = \int_{1/3}^1 \frac{(x^3)^{1/3} \left(\frac{x}{x^3} - 1 \right)^{1/3}}{x^4} dx$$

$$= \int_{1/3}^1 \frac{\left(\frac{1}{x^2} - 1\right)^{1/3}}{x^3} dx$$

मान लीजिए $\frac{1}{x^2} = t$ हो, तब $\frac{-2}{x^3} dx = dt$

जब $x = 1$ हो, तब $t = 1$ और जब $x = \frac{1}{3}$ हो, तब $t = 9$.

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2} \int_9^1 (t-1)^{1/3} dt \\ &= -\frac{1}{2} \left[\frac{(t-1)^{4/3}}{4/3} \right]_9^1 \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \left[(t-1)^{4/3} \right]_9^1 \\ &= -\frac{3}{8} [0 - (8)^{4/3}] = -\frac{3}{8} [-2^{3 \times \frac{4}{3}}] \\ &= -\frac{3}{8} (-16) = 6 \end{aligned}$$

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्न 10. यदि $f(x) = \int_0^x t \sin t dt$, तब $f'(x)$ है—

- (A) $\cos x + x \sin x$
 (B) $x \sin x$
 (C) $x \cos x$
 (D) $\sin x + x \cos x$

हल : ∵

$$f(x) = \int_0^x t \sin t dt$$

∴

$$\begin{aligned} \int t \sin t dt &= [t(-\cos t)] - \int (-\cos t) dt \\ &= -t \cos t + \sin t \end{aligned}$$

अब

$$\begin{aligned} \int_0^x t \sin t dt &= [-t \cos t]_0^x + [\sin t]_0^x = -x \cos x + \sin x \\ f'(x) &= -[1(\cos x) - x \sin x] + \cos x \\ &= -\cos x + x \sin x + \cos x = x \sin x \end{aligned}$$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्नावली 7.11

प्रश्न निश्चित समाकलनों के गुणधर्मों का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों में समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 1. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$

हल : मान लीजिए

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx \quad \dots(i) \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx \quad \left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \text{ से} \right] \end{aligned}$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx + \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx \\ &= \int_0^{\pi/2} (\cos^2 x + \sin^2 x) dx = \int_0^{\pi/2} 1 dx = [x]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \\ I &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$

हल : मान लीजिए

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \quad \dots(i) \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}}{\sqrt{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} + \sqrt{\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}} dx \\ &\quad \left[\because \int_0^x f(x) dx = \int_a^x f(a-x) dx \right] \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} dx \quad \dots(ii) \end{aligned}$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cos x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx \\ &= \int_0^{\pi/2} 1 dx = [x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \\ I &= \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx \quad \dots(i)$$

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]^{3/2}}{\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]^{3/2} + \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]^{3/2}} dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{3/2} x}{\cos^{3/2} x + \sin^{3/2} x} dx
 \end{aligned} \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned}
 2I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{3/2} x}{\cos^{3/2} x + \sin^{3/2} x} dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x}{\sin^{3/2} x + \cos^{3/2} x} dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} 1 dx = [x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

\therefore

उत्तर

प्रश्न 4. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx \quad \dots(i)$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]^5}{\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]^5 + \left[\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right]^5} dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^5 x}{\cos^5 x + \sin^5 x} dx \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned}
 2I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^5 x}{\cos^5 x + \sin^5 x} dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^5 x + \sin^5 x}{\sin^5 x + \cos^5 x} dx = \int_0^{\pi/2} 1 dx \\
 &= [x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

\therefore

उत्तर

$$I = \frac{\pi}{4}.$$

प्रश्न 5. $\int_{-5}^5 |x+2| dx$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int_{-5}^5 |x+2| dx &= \int_{-5}^{-2} |x+2| dx + \int_{-2}^5 |x+2| dx \\
 &= - \int_{-5}^{-2} |x+2| dx + \int_{-2}^5 |x+2| dx \\
 &\quad [\because \text{जब } x < -2, |x+2| = -(x+2) \\
 &\quad \text{और जब } x > -2, |x+2| = x+2] \\
 &= - \left[\frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-5}^{-2} + \left[\frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-2}^5 \\
 &= - \left[\left(\frac{(-2)^2}{2} - 4 \right) - \left(\frac{25}{2} - 10 \right) \right] + \left[\left(\frac{25}{2} + 10 \right) - \left(\frac{4}{2} - 4 \right) \right] \\
 &= - \left[(-2) - \frac{5}{2} \right] + \left[\frac{45}{2} - (-2) \right] = \frac{9}{2} + \frac{49}{2} = \frac{58}{2} \\
 &= 29.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 6. $\int_2^8 |x-5| dx$

हल :

$$\int_2^8 |x-5| dx = \int_2^5 |x-5| dx + \int_5^8 |x-5| dx$$

[$\because \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$]

जब $x < 5, |x-5| = -(x-5)$
और जब $x > 5, |x-5| = x-5$

$$\begin{aligned}
 \therefore &= \left[\frac{x^2}{2} - 5x \right]_2^5 + \left[\frac{x^2}{2} - 5x \right]_5^8 \\
 &= - \left[\left(\frac{25}{2} - 25 \right) - \left(\frac{4}{2} - 10 \right) \right] + \left[\left(\frac{64}{2} - 40 \right) - \left(\frac{25}{2} - 25 \right) \right] \\
 &= - \left[-\frac{25}{2} - (-8) \right] + \left[-8 - \left(-\frac{25}{2} \right) \right] \\
 &= - \left(\frac{-25+16}{2} \right) + \left(\frac{-16+25}{2} \right) = \frac{9}{2} + \frac{9}{2} = 9.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 7. $\int_0^1 x(1-x)^n dx$

हल :

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 x(1-x)^n dx &= \int_0^1 (1-x)[1-(1-x)]^n dx \\
 &\quad \left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right] \\
 &= \int_0^1 (1-x)x^n dx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{n+2}}{n+2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{n+2-n-1}{(n+1)(n+2)} \\
 &= \frac{1}{(n+1)(n+2)}. \tag*{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 8. $\int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx$.

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx$$

$$I = \int_0^{\pi/4} \log \left[1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right] dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right]$$

$$= \int_0^{\pi/4} \log \left(1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right) dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} \log \left(\frac{1 + \tan x + 1 - \tan x}{1 + \tan x} \right) dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} \log \left(\frac{2}{1 + \tan x} \right) dx$$

$$= \int_0^{\pi/4} [\log 2 - \log(1 + \tan x)] dx$$

$$= \log 2 \int_0^{\pi/4} dx - \int_0^{\pi/4} \log(1 + \tan x) dx$$

$$I = \log 2 [x]_0^{\pi/4} - I = \log 2 \cdot \frac{\pi}{4} - I$$

$$2I = (\log 2) \frac{\pi}{4}$$

$$I = \frac{\pi}{8} \log 2. \tag*{उत्तर}$$

प्रश्न 9. $\int_0^2 x\sqrt{2-x} dx$

हल :

$$\int_0^2 x\sqrt{2-x} dx = \int_0^2 (2-x)\sqrt{2-(2-x)} dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right]$$

$$= \int_0^2 (2-x)\sqrt{x} dx = \int_0^2 (2x^{1/2} - x^{3/2}) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[2 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{3/2} - \frac{2}{5} x^{5/2} \right]_0^2 \\
 &= \frac{4}{3} \cdot 2^{3/2} - \frac{2}{5} \cdot 2^{5/2} - 0 \\
 &= \frac{4}{3} \cdot 2\sqrt{2} - \frac{2}{5} \cdot 4\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{5} = \frac{16\sqrt{2}}{15}.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 10. $\int_0^{\pi/2} (2 \log \sin x - \log \sin 2x) dx$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/2} (2 \log \sin x - \log \sin 2x) dx \quad \dots(i)$$

$$\therefore I = \int_0^{\pi/2} [2 \log \sin \left(\frac{\pi}{2} - x \right) - \log \sin 2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right)] dx$$

$$I = \int_0^{\pi/2} (2 \log \cos x - \log \sin 2x) dx \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$2I = \int_0^{\pi/2} \{ [2(\log \sin x + \log \cos x)] - 2 \log \sin 2x \} dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} 2[\log \sin x \cos x - \log \sin 2x] dx$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \left[\log \left(\frac{\sin 2x}{2} \right) - \log \sin 2x \right] dx$$

$$= \int_0^{\pi/2} (\log \sin 2x - \log 2 - \log \sin 2x) dx$$

$$= - \int_0^{\pi/2} \log 2 dx$$

$$= - \log 2 \cdot [x]_0^{\pi/2} = - \frac{\pi}{2} \log 2 = \frac{\pi}{2} \log \frac{1}{2}.$$

उत्तर

प्रश्न 11. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x dx$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x dx$$

यदि $f(-x) = f(x)$, तब $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$

$\sin^2(-x) = \sin^2 x$ [$\because \sin^2 x$ एक सम फलन है]

$$\therefore I = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx \quad \dots(i)$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) dx \quad \left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right]$$

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$2I = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx + 2 \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^{\pi/2} (\sin^2 x + \cos^2 x) dx \\
 &= 2 \int_0^{\pi/2} 1 dx = 2[x]_0^{\pi/2} \\
 &= 2 \cdot \frac{\pi}{2} = \pi
 \end{aligned}$$

$$\therefore I = \frac{\pi}{2}.$$

उत्तर

प्रश्न 12. $\int_0^\pi \frac{x dx}{1 + \sin x}$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^\pi \frac{x dx}{1 + \sin x} \quad \dots(i)$$

$$= \int_0^\pi \frac{\pi - x}{1 + \sin(\pi - x)} \quad \dots(ii)$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a - x) dx \right]$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned}
 2I &= \int_0^\pi \frac{x}{1 + \sin x} dx + \int_0^\pi \frac{\pi - x}{1 + \sin x} dx \\
 &= \int_0^\pi \frac{x + \pi - x}{1 + \sin x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{dx}{1 + \sin x} \\
 &= \pi \int_0^\pi \frac{1 - \sin x}{1 - \sin^2 x} dx = \pi \int_0^\pi \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx
 \end{aligned}$$

$$= \pi \int_0^\pi (\sec^2 x - \sec x \tan x) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \pi \int_0^\pi \sec^2 x dx - \pi \int_0^\pi \sec x \tan x dx = \pi [\tan x - \sec x]_0^\pi \\
 &= \pi [0 - \sec \pi + \sec 0] = \pi [1 + 1] = 2\pi
 \end{aligned}$$

$$\therefore I = \pi$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^7 x dx.$

हल : $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^7 x dx$

यहाँ

\Rightarrow

अर्थात् f एक विषम फलन है।

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sin^7 x \\
 f(-x) &= \sin^7 (-x) = -\sin^7 x = -f(x)
 \end{aligned}$$

$$\therefore I = 0$$

$$\therefore \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^7 x dx = 0.$$

उत्तर

प्रश्न 14. $\int_0^{2\pi} \cos^5 x dx$

हल : माना कि

$$I = \int_0^{2\pi} \cos^5 x dx$$

यदि

$$f(x) = \cos^5 x, f(2\pi - x) = \cos^5 (2\pi - x) \\ = \cos^5 x = f(x)$$

तो

$$I = \int_0^{2\pi} f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

∴

$$I = \int_0^{2\pi} \cos^5 x dx = 2 \int_0^\pi \cos^5 x dx$$

$$\int_0^{2a} f(x) dx = 0 \text{ यदि } f(2a - x) = -f(x)$$

∴

$$f(x) = \cos^5 x \\ f(\pi - x) = \cos^5 (\pi - x) = (-\cos x)^5 \\ = -\cos^5 x = -f(x)$$

या

$$f(2a - x) = -f(x)$$

$$\left[\because \int_0^{2a} f(x) dx = 0 \right]$$

∴

$$I = 2 \int_0^\pi \cos^5 x dx = 0.$$

उत्तर

$$\text{प्रश्न 15. } \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x - \cos x}{1 + \sin x \cos x} dx.$$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x - \cos x}{1 + \sin x \cos x} dx$$

...(i)

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{1 + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a (a - x) dx \right]$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1 + \cos x \sin x} dx$$

...(ii)

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x - \cos x}{1 + \sin x \cos x} dx + \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x - \sin x}{1 + \cos x \sin x} dx \\ = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x - \cos x + \cos x - \sin x}{1 + \cos x \cos x} dx = 0$$

$$I = 0.$$

उत्तर

$$\text{प्रश्न 16. } \int_0^\pi \log(1 + \cos x) dx.$$

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^\pi \log(1 + \cos x) dx$$

...(i)

$$I = \int_0^\pi \log[1 + \cos(\pi - x)] dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a - x) dx \right]$$

$$= \int_0^\pi \log(1 - \cos x) dx$$

...(ii)

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$$\begin{aligned}
 2I &= \int_0^\pi \log(1 + \cos x) dx + \int_0^\pi \log(1 - \cos x) dx \\
 &= \int_0^\pi [\log(1 + \cos x) + \log(1 - \cos x)] dx \\
 &= \int_0^\pi \log(1 + \cos x)(1 - \cos x) dx \\
 &= \int_0^\pi \log(1 - \cos^2 x) dx = \int_0^\pi \log \sin^2 x dx \\
 &= 2 \int_0^\pi \log \sin x dx
 \end{aligned}$$

\therefore

$$I = \int_0^\pi \log \sin x dx$$

...(iii)

\therefore

$$I = 2 \int_0^{\pi/2} \log \sin x dx = 2I_1 \text{ (माना)}$$

...(iv)

जहाँ

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \log \sin x dx$$

...(v)

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right]$$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_0^{\pi/2} \log \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \log \cos x dx
 \end{aligned}$$

...(vi)

समी. (v) और (vi) को जोड़ने पर

$$\begin{aligned}
 2I_1 &= \int_0^{\pi/2} \log \sin x dx + \int_0^{\pi/2} \log \cos x dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} (\log \sin x + \log \cos x) dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \log \sin x \cos x dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \log\left(\frac{2 \sin x \cos x}{2}\right) dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} (\log \sin 2x - \log 2) dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \log \sin 2x dx - (\log 2) \int_0^{\pi/2} 1 dx \\
 &= \int_0^{\pi/2} \log \sin 2x dx - \frac{\pi}{2} \log 2
 \end{aligned}$$

मान लीजिए $2x = t$, हो, तब $2dx = dt$,

अतः

$$\begin{aligned}
 2I_1 &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \log \sin t dt - \frac{\pi}{2} \log 2 \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^\pi \log \sin x dx - \frac{\pi}{2} \log 2
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \int_0^{\pi/2} \log \sin x \, dx - \frac{\pi}{2} \log 2$$

$$\therefore 2I_1 = I_1 - \frac{\pi}{2} \log 2$$

$$I_1 = -\frac{\pi}{2} \log 2$$

इसका मान समीकरण (iv) में रखने पर

$$I = 2I_1 = -\pi \log 2.$$

उत्तर

प्रश्न 17. $\int_0^a \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{a-x}} \, dx$.

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^a \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{a-x}} \, dx \quad \dots(i)$$

$$\therefore I = \int_0^a \frac{\sqrt{a-x}}{\sqrt{a-x} + \sqrt{a-(a-x)}} \, dx$$

$$= \int_0^a \frac{\sqrt{a-x}}{\sqrt{a-x} + \sqrt{x}} \, dx \quad \left[\because \int_0^a f(x) \, dx = \int_0^a f(a-x) \, dx \right] \quad \dots(ii)$$

समी. (i) और (ii) को जोड़ने पर

$$2I = \int_0^a \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{a-x}} \, dx + \int_0^a \frac{\sqrt{a-x}}{\sqrt{a-x} + \sqrt{x}} \, dx$$

$$= \int_0^a \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a-x}}{\sqrt{x} + \sqrt{a-x}} \, dx = \int_0^a 1 \, dx = [x]_0^a = a$$

$$\therefore I = \frac{a}{2}.$$

उत्तर

प्रश्न 18. $\int_0^4 |x-1| \, dx$.

हल :

$$\int_0^4 |x-1| \, dx = - \int_0^1 |x-1| \, dx + \int_1^4 |x-1| \, dx$$

$$\left[\because \int_a^b f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx \right]$$

$$I = - \int_0^1 (x-1) \, dx + \int_1^4 (x-1) \, dx$$

$[\because |x-1| = -(x-1) \text{ यदि } x < 1$
 $\text{तथा } |x-1| = x-1 \text{ यदि } x > 1]$

$$= - \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 + \left[\frac{x^2}{2} - x \right]_1^4$$

$$\begin{aligned}
 &= -\left[\frac{1}{2} - 1\right] + \left(\frac{16}{2} - 4\right) - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \\
 &= \frac{1}{2} + 4 + \frac{1}{2} = 5.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 19. दर्शाइए कि $\int_0^a f(x)g(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$, यदि f और g को $f(x) = f(a - x)$ एवं $g(x) + g(a - x) = 4$ के रूप में परिभाषित किया गया है।

हल : $\int_0^a f(x)g(x)dx = \int_0^a f(a - x)g(a - x)dx \quad [\because \int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a - x)dx]$

\therefore दिया है $f(a - x) = f(x)$ तथा $g(x) + g(a - x) = 4$

या $g(a - x) = 4 - g(x)$

$$= \int_0^a f(x)[4 - g(x)]dx$$

$$= \int_0^a 4f(x)dx - \int_0^a f(x)g(x)dx$$

$$= 4 \int_0^a f(x)dx - \int_0^a f(x)g(x)dx$$

$\therefore 2 \int_0^a f(x)g(x)dx = 4 \int_0^a f(x)dx$

या $\int_0^a f(x)g(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

इति सिद्धम्।

प्रश्न 20 एवं 21 में सही उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न 20. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x + 1)dx$ का मान है :

- (A) 0 (B) 2 (C) π (D) 1

हल : मान लीजिए

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x + 1)dx$$

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 + x \cos x + \tan^5 x)dx + \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1dx$$

$$f(x) = x^3 + x \cos x + \tan^5 x$$

$$f(-x) = (-x)^3 + (-x) \cos(-x) + \tan^5(-x)$$

$$= -x^3 - x \cos x - \tan^5 x$$

$$= -(x^3 + x \cos x + \tan^5 x)$$

$$= -f(x)$$

$\therefore I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)dx - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x)dx + [x]_{-\pi/2}^{\pi/2}$

$$= 0 + \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right]$$

$[\because \int_{-a}^a f(x)dx = 0, \text{ यदि } f \text{ एक विषम फलन है}]$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{2} = \pi$$

अतः विकल्प (C) सही है।

उत्तर

प्रश्न 21. $\int_a^{\pi/2} \log \left(\frac{4+3 \sin x}{4+3 \cos x} \right) dx$ का मान है :

- (A) 2 (B) $\frac{3}{4}$ (C) 0 (D) -2

हल : मान लीजिए

$$I = \int_0^{\pi/2} \log \left(\frac{4+3 \sin x}{4+3 \cos x} \right) dx \quad \dots(i)$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \log \left(\frac{4+3 \sin \left(\frac{\pi}{2}-x \right)}{4+3 \cos \left(\frac{\pi}{2}-x \right)} \right) dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right]$$

$$I = \int_0^{\pi/2} \log \left(\frac{4+3 \cos x}{4+3 \sin x} \right) dx \quad \dots(ii)$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned} 2I &= \int_0^{\pi/2} \log \left(\frac{4+3 \sin x}{4+3 \cos x} \right) + \log \left(\frac{4+3 \cos x}{4+3 \sin x} \right) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \log \left(\frac{4+3 \sin x}{4+3 \cos x} \times \frac{4+3 \cos x}{4+3 \sin x} \right) dx \\ &= \int_0^{\pi/2} \log 1 dx = 0 \end{aligned}$$

या

$$I = 0$$

अतः विकल्प (C) सही है।

उत्तर

Baniapur

अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली

प्रश्न 1 से 24 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए—

प्रश्न 1. $\frac{1}{x-x^3}$.

हल :

$$\frac{1}{x-x^3} = \frac{1}{x(1-x^2)} = \frac{1}{x(1+x)(1-x)}$$

अब

$$\begin{aligned} \frac{1}{x(1+x)(1-x)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{1+x} + \frac{C}{1-x} \\ 1 &= A(1-x^2) + Bx(1-x) + Cx(1+x) \end{aligned}$$

$\therefore x = 0$ रखने पर,

$$1 = A \text{ या } A = 1$$

$x = -1$ रखने पर,

$$1 = B(-1)(1+1) = -2B \text{ या } B = -\frac{1}{2}$$

$x = 1$ रखने पर,

$$1 = C \cdot 1 \cdot (1+1) = 2C \text{ या } C = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{x-x^3} = \frac{1}{x} - \frac{1}{2(1+x)} + \frac{1}{2(1-x)}$$

$$\text{अतः } \int \frac{1}{x-x^3} dx = \int \frac{1}{x} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+x} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{1-x} dx$$

$$= \log|x| - \frac{1}{2} \log|1+x| - \frac{1}{2} \log|1-x| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log|x|^2 - \frac{1}{2} \log|1-x^2| + C$$

$$= \frac{1}{2} \log \left| \frac{x^2}{1-x^2} \right| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 2. $\frac{1}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}}$

$$\text{हल : } \int \frac{1}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{x+a} + \sqrt{x+b}} \times \left(\frac{\sqrt{x+a} - \sqrt{x+b}}{\sqrt{x+a} - \sqrt{x+b}} \right) dx$$

$$= \int \frac{\sqrt{x+a} - \sqrt{x+b}}{x+a - x-b} dx$$

$$= \frac{1}{a-b} \int [(x+a)^{1/2} - (x+b)^{1/2}] dx$$

$$= \frac{1}{a-b} \left[\frac{(x+a)^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{(x+b)^{3/2}}{\frac{3}{2}} \right] + C$$

Banjapur

$$= \frac{2}{3(a-b)} [(x+a)^{3/2} - (x+b)^{3/2}] + C.$$

उत्तर

प्रश्न 3. $\frac{1}{x\sqrt{ax-x^2}}$

$$\text{हल : } \int \frac{1}{x\sqrt{ax-x^2}} dx$$

$$x = \frac{a}{t} \text{ रखने पर तब } dx = -\frac{a}{t^2} dt$$

$$= \int \frac{-\frac{a}{t^2}}{\frac{a}{t} \sqrt{\frac{a^2}{t} - \frac{a^2}{t^2}}} dt = -\frac{1}{a} \int \frac{\frac{1}{t}}{\sqrt{t-1}} dt$$

$$= -\frac{1}{a} \int \frac{1}{\sqrt{t-1}} dt = -\frac{1}{a} \int (t-1)^{-1/2} dt$$

$$= -\frac{1}{a} \cdot \frac{(t-1)^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C = -\frac{2}{a} \sqrt{t-1} + C$$

$$= -\frac{2}{a} \sqrt{\frac{a}{x}-1} + C = -\frac{2}{a} \sqrt{\frac{a-x}{x}} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 4. $\int \frac{dx}{x^2(x^4+1)^{3/4}}.$

हल :

$$\int \frac{dx}{x^2(x^4+1)^{3/4}}$$

$$= \int \frac{dx}{x^2(x^4)^{3/4} \left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{3/4}}$$

$$= \int \frac{dx}{x^2 x^3 \left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{3/4}}$$

$$= \int \left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{-3/4} x^{-5} dx$$

$$1+\frac{1}{x^4}=t$$

$$1+x^{-4}=t$$

$$-4x^{-5} dx = dt$$

मान लीजिए

या
तब \Rightarrow

$$x^{-5} dx = -\frac{1}{4} dt$$

$$= -\frac{1}{4} \int t^{-3/4} dt$$

$$= -\frac{1}{4} \cdot \frac{\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{1-\frac{3}{4}}}{1-\frac{3}{4}} + C$$

$$= -\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{1/4} + C.$$

उत्तर

प्रश्न 5. $\frac{1}{x^{1/2}+x^{1/3}}.$

हल : $\int \frac{1}{x^{1/2}+x^{1/3}} dx = \frac{1}{x^{1/3}(1+x^{1/6})}$

अब $x^{1/6} = t$ रखने पर या $x = t^6$ हो, तब $dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned}
&= \int \frac{6t^5}{t^3 + t^2} dt = 6 \int \frac{t^5}{t^2(t+1)} dt = 6 \int \frac{t^3}{t+1} dt \\
&= 6 \int \frac{t^3 + 1 - 1}{t+1} dt = 6 \int \left(\frac{t^3 + 1}{t+1} - \frac{1}{t+1} \right) dt \\
&= 6 \int \left(\frac{(t+1)(t^2 - t + 1)}{t+1} - \frac{1}{t+1} \right) dt \\
&= 6 \int \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1} \right) dt \\
&= 6 \left(\frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + t - \log|t+1| \right) + C \\
&= 6 \left[\frac{1}{3}(x^{1/6})^3 - \frac{1}{2}(x^{1/6})^2 + x^{1/6} - \log(x^{1/6} + 1) \right] + C \\
&= 2\sqrt{x} - 3x^{1/3} + 6x^{1/6} - 6\log(x^{1/6} + 1) + C.
\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 6. $\frac{5x}{(x+1)(x^2+9)}$.

हल : आंशिक भिन्न के प्रयोग से,

$$\begin{aligned}
\frac{5x}{(x+1)(x^2+9)} &= \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+9} \\
5x &= A(x^2+9) + (Bx+C)(x+1) \\
&= A(x^2+9) + B(x^2+x) + C(x+1)
\end{aligned}$$

$x = -1$ लेने पर,

$$-5 = A \times 10 \text{ या } A = -\frac{1}{2}$$

x^2 के गुणांकों की तुलना करने पर

$$0 = A + B \text{ या } B = -A \text{ या } B = \frac{1}{2}$$

अचर राशि की तुलना करने पर

$$0 = 9A + C \text{ या } C = -9A = \frac{9}{2}$$

$$\begin{aligned}
\frac{5x}{(x+1)(x^2+9)} &= -\frac{1}{2(x+1)} + \frac{\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}}{x^2+9} \\
&= -\frac{1}{2(x+1)} + \frac{1}{2} \left(\frac{x+9}{x^2+9} \right)
\end{aligned}$$

∴

$$\begin{aligned}
\int \frac{5x}{(x+1)(x^2+9)} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x+1} dx + \frac{1}{2} \int \frac{x+9}{x^2+9} dx \\
&= -\frac{1}{2} \log|x+1| + \frac{1}{4} \int \frac{2x}{x^2+9} dx + \frac{9}{2} \int \frac{1}{x^2+9} dx + C
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \log|x+1| + \frac{1}{4} \log|x^2+9| + \frac{9}{2} \times \frac{1}{3} \tan^{-1} \frac{x}{3} + C \\
 &= -\frac{1}{2} \log|x+1| + \frac{1}{4} \log|x^2+9| + \frac{3}{2} \tan^{-1} \frac{x}{3} + C. \quad \text{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 7. $\frac{\sin x}{\sin(x-a)}.$

$$\begin{aligned}
 \text{हल : } \int \frac{\sin x}{\sin(x-a)} dx &= \int \frac{\sin(x-a+a)}{\sin(x-a)} dx \\
 &= \int \frac{\sin(x-a)\cos a + \cos(x-a)\sin a}{\sin(x-a)} dx \\
 &= \int [\cos a + \cot(x-a)\sin a] dx \\
 &= x \cos a + \sin a \log|\sin(x-a)| + C \\
 &= \sin a \log|\sin(x-a)| + x \cos a + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 8. $\frac{e^{5 \log x} - e^{4 \log x}}{e^{3 \log x} - e^{2 \log x}}.$

$$\text{हल : } \int \frac{e^{5 \log x} - e^{4 \log x}}{e^{3 \log x} - e^{2 \log x}} dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{e^{\log x^5} - e^{\log x^4}}{e^{\log x^3} - e^{\log x^2}} dx \\
 &= \int \frac{x^5 - x^4}{x^3 - x^2} dx \\
 &= \int \frac{x^4(x-1)}{x^2(x-1)} dx \\
 &= \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 9. $\frac{\cos x}{\sqrt{4-\sin^2 x}}.$

$$\text{हल : } \int \frac{\cos x}{\sqrt{4-\sin^2 x}} dx$$

मान लीजिए $\sin x = t$ हो, तब $\cos x dx = dt$

$$= \int \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} = \sin^{-1} \frac{t}{2} + C = \sin^{-1} \left(\frac{\sin x}{2} \right) + C.$$

उत्तर

प्रश्न 10. $\frac{\sin^8 x - \cos^8 x}{1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x}$

हल : $\int \frac{\sin^8 x - \cos^8 x}{1 - 2\sin^2 x \cos^2 x} dx$

यहाँ $\sin^8 x - \cos^8 x$

$$\begin{aligned}
 &= (\sin^4 x - \cos^4 x)(\sin^4 x + \cos^4 x) \\
 &= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^4 x + \cos^4 x) \\
 &= (\sin^2 x - \cos^2 x)\{(\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 2 \sin^2 x \cos^2 x\} \\
 &\quad [\because a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab] \\
 &= (\sin^2 x - \cos^2 x)[1 - 2 \sin^2 x \cos^2 x]
 \end{aligned}$$

अतः $\int \frac{\sin^8 x - \cos^8 x}{1 - 2\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{(\sin^2 x - \cos^2 x)(1 - 2\sin^2 x \cos^2 x)}{1 - 2\sin^2 x \cos^2 x} dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int (\sin^2 x - \cos^2 x) dx = - \int \cos 2x dx \\
 &= -\frac{\sin 2x}{2} + C = -\frac{1}{2} \sin 2x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 11. $\frac{1}{\cos(x+a)\cos(x+b)}$.

हल : $\int \frac{1}{\cos(x+a)\cos(x+b)} dx = \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin(a-b)}{\cos(x+a)\cos(x+b)} dx$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin(x+a-x-b)}{\cos(x+a)\cos(x+b)} dx \\
 &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{\sin(\overline{x+a} - \overline{x+b})}{\cos(x+a)\cos(x+b)} dx \\
 &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int \frac{-\cos(x+a)\sin(x+b)}{\cos(x+a)\cos(x+b)} dx \\
 &= \frac{1}{\sin(a-b)} \int [\tan(x+a) - \tan(x+b)] dx
 \end{aligned}$$

उत्तर

Baniapur

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{\sin(a-b)} [-\log|\cos(x+a)| + \log|\cos(x+b)|] + C \\
 &= -\frac{1}{\sin(a-b)} \log \left| \frac{\cos(x+a)}{\cos(x+b)} \right| + C \\
 &= \frac{1}{\sin(a-b)} \log \left| \frac{\cos(x+b)}{\cos(x+a)} \right| + C.
 \end{aligned}$$

प्रश्न 12. $\frac{x^3}{\sqrt{1-x^8}}$

हल :

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^8}} dx = \int \frac{x^3 dx}{\sqrt{1-(x^4)^2}}$$

मान लीजिए $x^4 = t$ रखने पर, $4x^3 dx = dt$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \frac{1}{4} \sin^{-1} t + C$$

$$= \frac{1}{4} \sin^{-1} x^4 + C.$$

उत्तर

प्रश्न 13. $\frac{e^x}{(1+e^x)(2+e^x)}.$

$$\text{हल : } \int \frac{e^x}{(1+e^x)(2+e^x)} dx$$

यहाँ $e^x = t$ रखने पर, $e^x dx = dt$

$$= \int \frac{dt}{(1+t)(2+t)}$$

अब

$\therefore t = -1$ लेने पर,

तथा $t = -2$ लेने पर,

$$\frac{1}{(1+t)(2+t)} = \frac{A}{1+t} + \frac{B}{2+t}$$

$$1 = A(2+t) + B(1+t)$$

$$1 = A \times 1 \text{ या } A = 1$$

$$1 = B(1-2) \text{ या } B = -1$$

$$= \int \frac{A}{1+t} dt + \int \frac{B}{2+t} dt$$

$$= \int \frac{1}{1+t} dt - \int \frac{1}{2+t} dt$$

$$= \log |1+t| - \log |2+t| + C$$

$$= \log \left(\frac{1+t}{2+t} \right) + C = \log \left| \frac{1+e^x}{2+e^x} \right| + C.$$

उत्तर

प्रश्न 14. $\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}$

$$\text{हल : } \int \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)}$$

$$x^2 = y \text{ रखने पर, } \frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{1}{(y+1)(y+4)} = \frac{A}{y+1} + \frac{B}{y+4}$$

$$\therefore 1 = A(y+4) + B(y+1)$$

$y = -1$ रखने पर,

$$1 = A(-1+4) = 3A \text{ या } A = \frac{1}{3}$$

तथा $y = -4$ रखने पर,

$$1 = B(-4+1) = -3B \text{ या } B = -\frac{1}{3}$$

अर्थात्

$$\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{1}{3(y+1)} - \frac{1}{3(y+4)} = \frac{1}{3(x^2+1)} - \frac{1}{3(x^2+4)}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{1}{3(x^2 + 1)} dx - \frac{1}{3} \int \frac{1}{x^2 + 4} dx \\
 &= \frac{1}{3} \tan^{-1} x - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \tan^{-1} \frac{x}{2} + C \\
 &= \frac{1}{3} \tan^{-1} x - \frac{1}{6} \tan^{-1} \frac{x}{2} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 15. $\cos^3 x e^{\log \sin x}$.

हल : $\int \cos^3 x e^{\log \sin x} dx = \int \cos^3 x \sin x dx$

मान लीजिए $\cos x = t$ हो, तब, $-\sin x dx = dt$ [$\because e^{\log x} = x$]

$$\begin{aligned}
 &= \int t^3 (-dt) = - \int t^3 dt = -\frac{t^4}{4} + C \\
 &= -\frac{\cos^4 x}{4} + C = -\frac{1}{4} \cos^4 x + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 16. $e^{3 \log x} (x^4 + 1)^{-1}$.

हल : $\int e^{3 \log x} (x^4 + 1)^{-1} dx$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{e^{\log x^3}}{x^4 + 1} dx = \int \frac{x^3}{x^4 + 1} dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \frac{dt}{t} = \frac{1}{4} \log |t| + C \\
 &= \frac{1}{4} \log |x^4 + 1| + C.
 \end{aligned}$$

[$\because e^{\log x} = x$]मान लीजिए $x^4 + 1 = t$ हो, तब, $4x^3 dx = dt$

उत्तर

प्रश्न 17. $f'(ax + b) [f(ax + b)]^n$.

हल : $\int [f(ax + b)]^n f'(ax + b) dx$

अब $(ax + b) = t$ रखने पर

$\therefore f'(ax + b). adx = dt$

Baniapur

$$\begin{aligned}
 &= \int t^n \cdot \frac{1}{a} dt = \frac{1}{a} \cdot \frac{t^{n+1}}{n+1} + C \\
 &= \frac{[f(ax + b)]^{n+1}}{a(n+1)} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 18. $\frac{1}{\sqrt{\sin^3 x \sin(x + \alpha)}}$.

हल : $\int \frac{1}{\sqrt{\sin^3 x \sin(x + \alpha)}} dx$.

अब

$$\begin{aligned}
 \sin^3 x \sin(x + \alpha) &= \sin^3 x (\sin x \cos \alpha + \cos x \sin \alpha) \\
 &= \sin^4 x (\cos \alpha + \cot x \sin \alpha)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \int \frac{1}{\sqrt{\sin^4 x (\cos \alpha + \cot x \sin \alpha)}} dx \\
 &= \int \frac{1}{\sin^2 x \sqrt{\cos \alpha + \cot x \sin \alpha}} dx \\
 &= \int \frac{\operatorname{cosec}^2 x}{\sqrt{\cos \alpha + \cot x \sin \alpha}} dx
 \end{aligned}$$

मान लीजिए $\cos \alpha + \cot x \sin \alpha = t$ हो, तब $\therefore -\operatorname{cosec}^2 x \sin \alpha dx = dt$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{\sin \alpha} \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = -\frac{1}{\sin \alpha} \int t^{-1/2} dt \\
 &= -\frac{1}{\sin \alpha} \frac{t^{1/2}}{\frac{1}{2}} + C \\
 &= -\frac{2}{\sin \alpha} \sqrt{\cos \alpha + \cot x \sin \alpha} + C \\
 &= -\frac{2}{\sin \alpha} \sqrt{\cos \alpha + \frac{\cos x}{\sin x} \sin \alpha} + C \\
 &= -\frac{2}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{\sin x \cos \alpha + \cos x \sin \alpha}{\sin x}} + C \\
 &= -\frac{2}{\sin \alpha} \sqrt{\frac{\sin(x + \alpha)}{\sin x}} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 19. $\frac{\sin^{-1} \sqrt{x} - \cos^{-1} \sqrt{x}}{\sin^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{x}}, (x \in [0, 1]).$

हल : $\int \frac{\sin^{-1} \sqrt{x} - \cos^{-1} \sqrt{x}}{\sin^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{x}} dx$

चूंकि प्रतिलोम वृत्तीय फलन से,

$$\begin{aligned}
 \sin^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{x} &= \frac{\pi}{2} \\
 \therefore \cos^{-1} \sqrt{x} &= \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \sqrt{x} \\
 &= \int \frac{\sin^{-1} \sqrt{x} - \left(\frac{\pi}{2} - \sin^{-1} \sqrt{x} \right)}{\frac{\pi}{2}} dx \\
 &= \frac{2}{\pi} \int 2 \sin^{-1} \sqrt{x} dx - \int dx \\
 &= \frac{4}{\pi} \int \sin^{-1} \sqrt{x} dx - x
 \end{aligned}$$

Baniapur

मान लीजिए $x = t^2$ हो, तब $dx = 2t dt$

$$= \frac{4}{\pi} \int \sin^{-1} t \cdot 2t dt - x \\ = -x + \frac{8}{\pi} \int (\sin^{-1} t) t dt$$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$= -x + \frac{8}{\pi} \left[(\sin^{-1} t) \frac{t^2}{2} - \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \cdot \frac{t^2}{2} dt \right] \\ = -x + \frac{4}{\pi} t^2 \sin^{-1} t - \frac{4}{\pi} \int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ = -x + \frac{4}{\pi} t^2 \sin^{-1} t + \frac{4}{\pi} \int \frac{1-t^2-1}{\sqrt{1-t^2}} dt \\ = -x + \frac{4}{\pi} t^2 \sin^{-1} t + \frac{4}{\pi} \int \left(\sqrt{1-t^2} - \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \right) dt \\ = -x + \frac{4}{\pi} t^2 \sin^{-1} t + \frac{4}{\pi} \left[\frac{t\sqrt{1-t^2}}{2} + \frac{1}{2} \sin^{-1} t - \sin^{-1} t \right] + C \\ = -x + \frac{4}{\pi} t^2 \sin^{-1} t + \frac{2}{\pi} t\sqrt{1-t^2} - \frac{2}{\pi} \sin^{-1} t + C \\ = -x + \frac{4}{\pi} x \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{2}{\pi} \sqrt{x} \sqrt{1-x} - \frac{2}{\pi} \sin^{-1} \sqrt{x} + C \\ = -x + \frac{2}{\pi} (2x-1) \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{2}{\pi} \sqrt{x} \sqrt{1-x} + C \\ = \frac{2(2x-1)}{\pi} \sin^{-1} \sqrt{x} + \frac{2\sqrt{x-x^2}}{\pi} - x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 20. $\sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}}.$

हल : $\int \sqrt{\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}} dx$

मान लीजिए $\sqrt{x} = \cos t$ या $x = \cos^2 t$ रखने पर

$$\therefore dx = -2 \cos t \sin t dt$$

$$= \int \sqrt{\frac{1-\cos t}{1+\cos t}} (-2 \cos t \sin t) dt \\ = -2 \int \sqrt{\frac{2 \sin^2 \frac{t}{2}}{2 \cos^2 \frac{t}{2}}} \times \cos t \sin t dt$$

$$\begin{aligned}
 &= -2 \int \frac{\sin \frac{t}{2}}{\cos \frac{t}{2}} \left(2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2} \cos t \right) dt \\
 &\quad \left[\because \sin A = 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} \right] \\
 &= -4 \int \sin^2 \frac{t}{2} \cos t dt = -4 \int \frac{1 - \cos t}{2} \cos t dt \\
 &= -2 \int (\cos t - \cos^2 t) dt \\
 &= -2 \int \left[\cos t - \frac{1 + \cos 2t}{2} \right] dt \\
 &= -2 \sin t + \left(t + \frac{\sin 2t}{2} \right) + C \\
 &= t + \sin t \cos t - 2 \sin t + C
 \end{aligned}$$

अब पुनः $\cos t = \sqrt{x}$ रखने पर $\therefore \sin t = \sqrt{1-x}$, $t = \cos^{-1} \sqrt{x}$, के मान रखने पर

$$\begin{aligned}
 &= \cos^{-1} \sqrt{x} - 2\sqrt{1-x} + \sqrt{x}\sqrt{1-x} + C \\
 &= -2\sqrt{1-x} + \cos^{-1} \sqrt{x} + \sqrt{x-x^2} + C.
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 21. $\frac{2 + \sin 2x}{1 + \cos 2x} e^x.$

$$\begin{aligned}
 \text{हल : } \int \frac{2 + \sin 2x}{1 + \cos 2x} e^x dx &= \int \frac{2 + 2 \sin x \cos x}{2 \cos^2 x} e^x dx \\
 &= \int \frac{1 + \sin x \cos x}{\cos^2 x} e^x dx \\
 &= \int e^x (\tan x + \sec^2 x) dx
 \end{aligned}$$

अब $e^x \tan x = t$ रखने पर

$$(e^x \sec^2 x + e^x \tan x) dx = dt \text{ या } e^x (\tan x + \sec^2 x) dx = dt$$

$$= \int dt = t + C = e^x \tan x + C.$$

उत्तर

प्रश्न 22. $\frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2(x+2)}$

$$\text{हल : } \int \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2(x+2)} dx$$

अब

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2(x+2)} &= \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2} \\
 \therefore x^2 + x + 1 &= A(x+1)^2 + B(x+2)(x+1) + C(x+2) \\
 &= A(x^2 + 2x + 1) + B(x^2 + 3x + 2) + C(x+2)
 \end{aligned}$$

$x = -2$ लेने पर,

$$4 - 2 + 1 = A(-1)^2 \text{ या } 3 = A \text{ या } A = 3$$

तथा $x = -1$ लेने पर,

$$1 - 1 + 1 = C(-1 + 2) = C \text{ या } C = 1$$

x^2 के गुणांकों की तुलना करने पर,

$$1 = A + B \text{ या } B = 1 - A = 1 - 3 = -2$$

$$\therefore \frac{x^2 + x + 1}{(x+2)(x+1)^2} = \frac{3}{x+2} - \frac{2}{x+1} + \frac{1}{(x+1)^2}$$

अब

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)^2(x+2)} dx &= 3 \int \frac{1}{x+2} dx - 2 \int \frac{1}{x+1} dx + \int \frac{1}{(x+1)^2} dx \\ &= 3 \log|x+2| - 2 \log|x+1| + \int (x+1)^{-2} dx \\ &= 3 \log|x+2| - 2 \log|x+1| + \frac{(x+1)^{-1}}{-1} + C \\ &= 3 \log|x+2| - 2 \log|x+1| - \frac{1}{x+1} + C \\ &= -2 \log|x+1| - \frac{1}{x+1} + 3 \log|x+2| + C. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 23. $\tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$.

हल : माना कि

मान लीजिए $x = \cos \theta$ हो, तब, $dx = -\sin \theta d\theta$

$$I = \int \tan^{-1} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

$$= - \int \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}} \right) \sin \theta d\theta$$

$$= - \int \tan^{-1} \left(\sqrt{\frac{2\sin^2 \frac{\theta}{2}}{2\cos^2 \frac{\theta}{2}}} \right) \sin \theta d\theta$$

$$= - \int \tan^{-1} \left(\tan \frac{\theta}{2} \right) \sin \theta d\theta$$

$$= - \int \frac{\theta}{2} \sin \theta d\theta = - \frac{1}{2} \int \theta \sin \theta d\theta$$

खण्डशः समाकलन करने पर,

$$= - \frac{1}{2} [\theta(-\cos \theta) - \int 1 \cdot (-\cos \theta) d\theta]$$

$$= \frac{1}{2} \theta \cos \theta - \frac{1}{2} \sin \theta + C$$

पुनः $x = \cos \theta$ रखने पर $\theta = \cos^{-1} x, \sin \theta = \sqrt{1-x^2}$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2}x \cos^{-1} x - \frac{1}{2}\sqrt{1-x^2} + C \\&= \frac{1}{2}(x \cos^{-1} x - \sqrt{1-x^2}) + C.\end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 24. $\frac{\sqrt{x^2+1} [\log(x^2+1) - 2 \log x]}{x^4}$.

हल : $\int \frac{\sqrt{x^2+1} [\log(x^2+1) - 2 \log x]}{x^4} dx$

$$\begin{aligned}&= \int \frac{\sqrt{x^2+1} \log\left(\frac{x^2+1}{x^2}\right)}{x^4} dx \\&= \int \frac{x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right) \log\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^4} dx \\&= \int \frac{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} \log\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^3} dx\end{aligned}$$

मान लीजिए

$$1 + \frac{1}{x^2} = t \text{ हो, तब } \frac{-2}{x^3} dx = dt$$

$$\begin{aligned}&= \int \frac{\sqrt{t} \log t}{-2} dt \\&= -\frac{1}{2} \int \sqrt{t} \log t dt\end{aligned}$$

$$= -\frac{1}{2} \log t \times \frac{t^{3/2}}{3} - \int \frac{t^{3/2}}{3} \times \frac{1}{t} dt$$

$$= -\frac{1}{3} \left[t^{3/2} \log t - \int \sqrt{t} dt \right]$$

$$= -\frac{1}{3} \left[t^{3/2} \log t - \frac{t^{3/2}}{\frac{3}{2}} \right] + C$$

$$= -\frac{1}{3} t^{3/2} \left[\log t - \frac{2}{3} \right] + C$$

$$= -\frac{1}{3} \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)^{3/2} \left[\log\left(1 + \frac{1}{x^2}\right) - \frac{2}{3} \right] + C.$$

उत्तर

प्रश्न 25 से 33 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए।

प्रश्न 25. $\int_{\pi/2}^{\pi} e^x \left(\frac{1-\sin x}{1-\cos x} \right) dx.$

हल : $\int_{\pi/2}^{\pi} e^x \left(\frac{1-\sin x}{1-\cos x} \right) dx$

$$= \int_{\pi/2}^{\pi} e^x \left(\frac{1 - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} \right) dx$$

$$= - \int_{\pi/2}^{\pi} e^x \left(\cot \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} \right) dx$$

मान लीजिए $e^x \cot \frac{x}{2} = t$ हो, तो $\left(e^x \cot \frac{x}{2} - \frac{1}{2} e^x \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} \right) dx = dt$

या $e^x \left(\cot \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \operatorname{cosec}^2 \frac{x}{2} \right) dx = dt$

$$= - \int dt = -t + C = -e^x \cot \frac{x}{2} + C$$

$$\therefore \int_{\pi/2}^{\pi} e^x \left(\frac{1-\sin x}{1-\cos x} \right) dx = - \int_{\pi/2}^{\pi} dt = [-t]_{\pi/2}^{\pi} + C = \left[-e^x \cot \frac{x}{2} \right]_{\pi/2}^{\pi}$$

$$= -e^{\pi} \cot \frac{\pi}{2} + e^{\pi/2} \cot \frac{\pi}{4}$$

Since $\cot \frac{\pi}{2} = 0$ and $\cot \frac{\pi}{4} = 1$

$$= e^{\pi} (-0) + e^{\pi/2} \cdot 1$$

$$= e^{\pi/2}.$$

उत्तर

प्रश्न 26. $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x \cos x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx.$

Baniapur

हल : $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x \cos x}{\cos^4 x + \sin^4 x} dx$

अंश व हर को $\cos^4 x$ से भाग देने पर

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x \sec^2 x dx}{1 + \tan^4 x}$$

मान लीजिए $\tan 2x = t$ हो, तब

$$2 \tan x \sec^2 x dx = dt$$

अब $x = 0$ हो, तो $t = 0$ और जब $x = \pi/4$ हो, तब $t = 1$.

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2}$$

$$= \frac{1}{2} [\tan^{-1} t]_0^1 = \frac{1}{2} \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{8}.$$

उत्तर

प्रश्न 27. $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x dx}{\cos^2 x + 4 \sin^2 x}$.

हल : $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x dx}{\cos^2 x + 4 \sin^2 x} = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x + 4 - 4 \cos^2 x} dx$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2 x}{4 - 3 \cos^2 x} dx$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{3 \cos^2 x}{4 - 3 \cos^2 x} dx$$

$$= \frac{-1}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{4 - 3 \cos^2 x - 4}{4 - 3 \cos^2 x} dx$$

$$= \frac{-1}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{4 - 3 \cos^2 x}{4 - 3 \cos^2 x} dx - \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{4 - 3 \cos^2 x}$$

$$= -\frac{1}{3} [x]_0^{\pi/2} - \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{4 - 3 \cos^2 x}$$

$$= -\frac{\pi}{6} + \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 x}{4 \sec^2 x - 3} dx$$

[\cos^2 से अंश व हर से भाग करने पर]

$$= -\frac{\pi}{6} + \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 x}{4(1 + \tan^2 x) - 3} dx$$

$$= -\frac{\pi}{6} + \frac{4}{3} \int_0^{\pi/2} \frac{\sec^2 x}{1 + 4 \tan^2 x} dx$$

Banjapur

पुनः $\tan x = t$ रखने पर, $\sec^2 x dx = dt$, जब $x = \frac{\pi}{2}$ तो $t = \tan \frac{\pi}{2} = \infty$

जब $x = 0$ तो $t = 0$

$$= -\frac{\pi}{6} + \frac{4}{3} \int_0^\infty \frac{1}{1+4t^2} dt = -\frac{\pi}{6} + \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} [\tan^{-1} 2t]_0^\infty$$

$$= -\frac{\pi}{6} + \frac{2}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6}.$$

उत्तर

प्रश्न 28. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$.

हल : $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{\sin 2x}} dx$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 - [1 - \sin 2x]}} dx$$

$$= \int_{\pi/6}^{\pi/3} \frac{\sin x + \cos x}{\sqrt{1 - [\sin x - \cos x]^2}} dx$$

मान लीजिए $\sin x - \cos x = t$ हो, तब, $(\cos x + \sin x) dx = dt$

$$\text{जब } x = \frac{\pi}{3} \text{ तो } t = \sin \frac{\pi}{3} - \cos \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$\text{तथा जब } x = \frac{\pi}{6} \text{ तो } t = \sin \frac{\pi}{6} - \cos \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \int_{\frac{\sqrt{3}-1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}-1}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = [\sin^{-1} t]_{\frac{\sqrt{3}-1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}-1}{2}} \\ &= -\left[\sin^{-1} \frac{1-\sqrt{3}}{2} - \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}-1}{2} \right] \\ &= -\sin^{-1} \frac{1-\sqrt{3}}{2} + \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}-1}{2} \quad [\because \sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x] \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 29. $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}}$.

हल : $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}}$

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x} - \sqrt{x}} \times \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} dx \\ &\stackrel{\text{Since}}{=} \int_0^1 \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{1+x-x} dx = \int_0^1 (\sqrt{1+x} + \sqrt{x}) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{2}{3} \left[(1+x)^{3/2} + x^{3/2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} [2^{3/2} + 1 - 1] \\ &= \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}. \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 30. $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x + \cos x}{9 + 16 \sin 2x} dx.$

हल : $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x + \cos x}{9 + 16 \sin 2x} dx$

मान लीजिए $\sin x - \cos x = t$ हो, तब $(\cos x + \sin x) dx = dt$

$$\text{जब } x = \frac{\pi}{4} \text{ तो } t = 0 \text{ तथा जब } x = 0 \text{ तो } t = -1$$

$$\begin{aligned} (\sin x - \cos x)^2 &= 1 - 2 \sin x \cos x = 1 - \sin 2x \\ \therefore \sin 2x &= 1 - (\sin x - \cos x)^2 = 1 - t^2 \end{aligned}$$

$$= \int_{-1}^0 \frac{dt}{9 + 16(1 - t^2)} = \int_{-1}^0 \frac{dt}{25 - 16t^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{16} \int_{-1}^0 \frac{dt}{\frac{25}{16} - t^2} \\
 &= \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} \left[\log \left(\frac{\frac{5}{4} + t}{\frac{5}{4} - t} \right) \right]_{-1}^0 \\
 &= \frac{1}{40} [(\log 1 - (\log 1 - \log 9))] \\
 &= \frac{1}{40} \left(\log \frac{1}{9} \right) = \frac{1}{40} \log 9. \tag{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 31. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x \tan^{-1}(\sin x) dx$

हल : $\int_0^{\pi/2} \sin 2x \tan^{-1}(\sin x) dx = 2 \int_0^{\pi/2} \sin x \cos x \tan^{-1}(\sin x) dx$

मान लीजिए $\sin x = t$ हो, तब, $\cos x dx = dt$

जब $x = \frac{\pi}{2}$ तो $t = 1$, तथा जब $x = 0$ तो $t = 0$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^1 t \tan^{-1} t dt \\
 &= 2 \left[\tan^{-1} t \cdot \frac{t^2}{2} \right]_0^1 - 2 \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} \times \frac{t^2}{2} dt \\
 &= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \frac{1+t^2-1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} - \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\
 &= \frac{\pi}{4} - [t - \tan^{-1} t]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}(1 - \tan^{-1} 1 - 0) \\
 &= \frac{\pi}{4} - \left(1 - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - 1. \tag{उत्तर}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 32. $\int_0^\pi \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} dx.$

हल :

$$I = \int_0^\pi \frac{x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \quad \dots(i)$$

$$\therefore I = \int_0^\pi \frac{(\pi-x) \tan(\pi-x)}{\sec(\pi-x) + \tan(\pi-x)} dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \tan x}{\sec x - \tan x} dx \\
 &\quad [\because \sec(\pi - x) = -\sec x \text{ एवं } \tan(\pi - x) = -\tan x] \\
 I &= \int_0^\pi \frac{(\pi - x) \tan x}{\sec x + \tan x} dx \quad \dots(ii)
 \end{aligned}$$

समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned}
 2I &= \int_0^\pi \frac{[x + (\pi - x)] \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\
 &= \pi \int_0^\pi \frac{\tan x}{\sec x + \tan x} dx \\
 &= \pi \int_0^\pi \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{1}{\cos x} + \frac{\sin x}{\cos x}} dx \\
 &= \pi \int_0^\pi \frac{\sin x dx}{1 + \sin x} \\
 &= \pi \int_0^\pi \frac{1 + \sin x - 1}{1 + \sin x} dx = \pi \int_0^\pi \left(1 - \frac{1}{1 + \sin x}\right) dx \\
 &= \pi [x]_0^\pi - \pi \int_0^\pi \frac{1}{1 + \sin x} \times \frac{1 - \sin x}{1 - \sin x} dx \\
 &= \pi^2 - \pi \int_0^\pi \frac{1 - \sin x}{\cos^2 x} dx \\
 &= \pi^2 - \pi \int_0^\pi (\sec^2 x - \sec x \tan x) dx \\
 &= \pi^2 - \pi [\tan x - \sec x]_0^\pi \\
 &= \pi^2 - \pi [(\tan \pi - \sec \pi) - \tan 0 - \sec 0] \\
 &= \pi^2 - \pi [1 + 1] = \pi^2 - 2\pi
 \end{aligned}$$

$$I = \frac{\pi^2 - 2\pi}{2} = \frac{\pi}{2}[\pi - 2].$$

उत्तर

प्रश्न 33. $\int_1^4 (|x-1| + |x-2| + |x-3|) dx.$

हल : मान लीजिए

$$\begin{aligned}
 I &= \int_1^4 (|x-1| + |x-2| + |x-3|) dx \\
 &= \int_1^4 |x-1| dx + \int_1^4 |x-2| dx + \int_1^4 |x-3| dx \\
 &= I_1 + I_2 + I_3 \quad (\text{माना})
 \end{aligned}$$

$$I_1 = \int_1^4 |x-1| dx = \int_1^4 (x-1) dx \quad [\because x > 1]$$

$$= \left| \frac{x^2}{2} - x \right|_1^4 = (8 - 4) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right) = 4 + \frac{1}{2} = 4\frac{1}{2} \quad \dots(i)$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_1^4 |x-2| dx = \int_1^2 |x-2| dx + \int_2^4 |x-2| dx \\ &= -\int_1^2 (x-2) dx + \int_2^4 (x-2) dx \end{aligned}$$

∴ जब $1 < x < 2$ तो $|x-2| = -(x-2)$

तथा जब $2 < x < 4$ तो $|x-2| = x-2$

$$\begin{aligned} I_2 &= \left[-\frac{x^2}{2} + 2x \right]_1^2 + \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^4 \\ &= \left[\left(-\frac{4}{2} + 4 \right) - \left(-\frac{1}{2} + 2 \right) \right] + \left[\left(\frac{16}{2} - 8 \right) - \left(\frac{4}{2} - 4 \right) \right] \\ &= \left[2 - \frac{3}{2} + 2 \right] = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \quad \dots(iii) \end{aligned}$$

और

$$I_3 = \int_1^4 |x-3| dx = \int_1^3 |x-3| dx + \int_3^4 |x-3| dx$$

∴ जब $1 < x < 3$ तो $|x-3| = -(x-3)$

तथा जब $3 < x < 4$ तो $|x-3| = x-3$

$$\begin{aligned} I_3 &= \int_1^4 -(x-3) dx + \int_3^4 (x-3) dx \\ &= \left[-\frac{x^2}{2} + 3x \right]_1^3 + \left[\frac{x^2}{2} - 3x \right]_3^4 \\ &= \left[\left(-\frac{9}{2} + 9 \right) - \left(-\frac{1}{2} + 3 \right) \right] + \left[\left(\frac{16}{2} - 12 \right) - \left(\frac{9}{2} - 9 \right) \right] \\ &= \left(\frac{9}{2} - \frac{5}{2} \right) + \left(-4 + \frac{9}{2} \right) = \frac{5}{2} \quad \dots(iii) \end{aligned}$$

समीकरण (i), (ii) व (iii) को जोड़ने पर,

$$\begin{aligned} I_1 + I_2 + I_3 \\ = \frac{9}{2} + \frac{5}{2} + \frac{5}{2} = \frac{19}{2}. \end{aligned}$$

उत्तर

निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए (प्रश्न 34 से 39 तक) :

$$\text{प्रश्न 34. } \int_1^3 \frac{dx}{x^2(x+1)} = \frac{2}{3} + \log \frac{2}{3}$$

$$\text{हल : बायाँ पक्ष : } \int_1^3 \frac{dx}{x^2(x+1)}$$

$$\begin{aligned} \text{यहाँ} \quad \frac{1}{x^2(x+1)} &= \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x+1} \\ \therefore \quad 1 &= Ax(x+1) + B(x+1) + Cx^2 \\ x = 0 \text{ लेने पर,} \quad 1 &= B \times 1 \text{ या } B = 1 \\ x = -1 \text{ लेने पर,} \quad 1 &= C(-1)^2 \text{ या } C = 1 \\ x^2 \text{ के गुणांकों की तुलना करने पर} \quad 1 &= Ax^2 \end{aligned}$$

$$0 = A + C \text{ या } A = -C = -1$$

$$\therefore \frac{1}{x^2(x+1)} = \frac{-1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1}$$

$$\begin{aligned}\therefore \int_1^3 \frac{1}{x^2(x+1)} dx &= \int_1^3 -\frac{1}{x} dx + \int_1^3 \frac{1}{x^2} dx + \int_1^3 \frac{1}{x+1} dx \\&= [-\log|x|]_1^3 - \left[\frac{1}{x} \right]_1^3 + [\log|x+1|]_1^3 \\&= (-\log 3 + \log 1) + \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{1} \right) + \log 4 - \log 2 \\&= -\log 3 + \frac{2}{3} + 2 \log 2 - \log 2 \\&= \frac{2}{3} + \log \frac{2}{3} = \text{दायঁ पক্ষ।}\end{aligned}$$

প্রশ্ন 35. $\int_0^1 xe^x dx = 1.$

হল : বাযঁ পক্ষ $\int_0^1 xe^x dx$

x কো পহলা ফলন মানকর খণ্ডশ: সমাকলন করনে পর

$$\begin{aligned}&= [xe^x]_0^1 - \int_0^1 1 \cdot e^x dx \\&= 1 \cdot e^1 - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1 = \text{দাযঁ পক্ষ।}\end{aligned}$$

প্রশ্ন 36. $\int_{-1}^1 x^{17} \cos^4 x dx = 0.$

হল : মান লীজিএ

$$I = \int_{-1}^1 x^{17} \cos^4 x dx$$

$$\begin{aligned}f(x) &= x^{17} \cos^4 x, f(-x) = (-x)^{17} \cos^4 (-x) dx \\&= -(x^{17} \cos^4 x)\end{aligned}$$

$$\therefore f(-x) = -f(x) \int_{-a}^a f(x) dx = 0 \text{ যদি } f \text{ বিষম ফলন হো}$$

$$I = 0 \text{ অর্থাৎ } \int_{-1}^1 x^{17} \cos^4 x dx = 0.$$

ইতি সিদ্ধম্।

প্রশ্ন 37. $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = \frac{2}{3}.$

হল : মান লীজিএ

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx$$

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$$

$$\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4}$$

$$I = \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} (3 \sin x - \sin 3x) dx$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} \left[-3 \cos x + \frac{\cos 3x}{3} \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{1}{4} \left[0 - \left(-3 + \frac{1}{3} \right) \right] = \frac{1}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{2}{3}.
 \end{aligned}$$

इति सिद्धम्।

प्रश्न 38. $\int_0^{\pi/4} 2 \tan^3 x dx = 1 - \log 2.$

हल : बायाँ पक्ष: $\int_0^{\pi/4} 2 \tan^3 x dx = 2 \int_0^{\pi/4} \tan^3 x dx$

$$\begin{aligned}
 &= 2 \int_0^{\pi/4} \tan x \cdot \tan^2 x dx \\
 &= 2 \int_0^{\pi/4} \tan x (\sec^2 x - 1) dx \\
 &= 2 \int_0^{\pi/4} \tan x \sec^2 x dx - 2 \int_0^{\pi/4} \tan x dx = 2[I_1 - I_2]
 \end{aligned}$$

यहाँ $\tan x = t$ तब $\sec^2 x dx = dt$ जब $x = 0$ हो तब $t = 0$ और जब $x = \frac{\pi}{4}$ हो, तब $t = 1$

∴

और

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \int_0^1 dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \\
 I_2 &= \int_0^{\pi/4} \tan x dx = -[\log \cos x]_0^{\pi/4} \\
 &= -\left[\log \cos \frac{\pi}{4} - \log \cos 0 \right] \\
 &= -\left[\log \frac{1}{\sqrt{2}} - \log 1 \right] = -\log \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \log 2
 \end{aligned}$$

अब

$$2(I_1 - I_2) = 2 \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2 \right] = 1 - \log 2 = \text{दायाँ पक्ष।}$$

प्रश्न 39. $\int_0^1 \sin^{-1} x dx = \frac{\pi}{2} - 1.$

हल : बायाँ पक्ष : $\int_0^1 \sin^{-1} x \cdot 1 dx$ $\sin^{-1} x$ को पहला फलन मानकर खण्डशः समाकलन करने पर

$$\begin{aligned}
 &= \left[(\sin^{-1} x)x \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \cdot x dx \\
 &= [\sin^{-1} x]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{-2x}{\sqrt{1-x^2}} dx \\
 &= \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \times 2 \left[\sqrt{1-x^2} \right]_0^1 \\
 &= \frac{\pi}{2} - 1 = \text{दायाँ पक्ष।}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 40. योगफल की सीमा के रूप में $\int_0^1 e^{2-3x} dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

हल : मान लीजिए $I = \int_0^1 e^{2-3x} dx$

$$\therefore \int_a^b f(x) dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[f(a) + f(a+h) + f(a+2h) + \dots + f(a+n-1h)]$$

जबकि $h = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$ या $nh = 1$ $[\because a=0, b=1]$

$$f(x) = e^{2-3x}, f(a) = e^{2-0} = e^2, f(a+h)$$

$$= e^{2-3h}$$

$$f(a+2h) = e^{2-6h}, f(a+3h) = e^{2-9h}, \dots$$

$$f(a+n-1h) = e^{2-3(n-1)h}$$

$$\therefore \int_0^1 e^{2-3x} dx = \lim_{h \rightarrow 0} h[e^2 + e^{2-3h} + e^{2-6h} + e^{2-9h} + \dots + e^{2-3(n-1)h}]$$

जबकि $nh \rightarrow h-a = 1-0 = 1$

$$\therefore I = \lim_{h \rightarrow 0} he^2[1 + e^{-3h} + e^{-6h} + e^{-9h} + \dots + e^{-3(n-1)h}]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} he^2 \left[\frac{[e^{-3h}]^h - 1}{e^{-3h} - 1} \right] \quad \left[\because S = \frac{a(r^n - 1)}{a-1} \text{ गुणोत्तर श्रेढ़ी के लिए} \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} he^2 (e^{-3nh} - 1) \left(\frac{-3h}{e^{-3h} - 1} \right) \times \frac{1}{-3h}$$

अब $nh \rightarrow 1, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3h}{e^{-3h} - 1} = \log e = 1$

Banpur

$$= \frac{1}{3}[e^{-1} - e^2] = \frac{1}{3}\left(e^2 - \frac{1}{e}\right).$$

उत्तर

प्रश्न 41 से 44 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए :

प्रश्न 41. $\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}}$ बराबर है :

- (A) $\tan^{-1}(e^x) + C$
 (C) $\log(e^x - e^{-x}) + C$

- (B) $\tan^{-1}(e^{-x}) + C$
 (D) $\log(e^x + e^{-x}) + C$

हल :

$$\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = \int \frac{dx}{e^x + \frac{1}{e^x}} = \int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 1}$$

मान लीजिए $e^x = t$ हो, तब $e^x dx = dt$

$$= \int \frac{dt}{t^2 + 1} = \tan^{-1} t + C = \tan^{-1} e^x + C.$$

अतः विकल्प (A) सही है।

उत्तर

प्रश्न 42. $\int \frac{\cos 2x}{(\sin x + \cos x)^2} dx$ बराबर है :

- (A) $\frac{-1}{\sin x + \cos x} + C$ (B) $\log |\sin x + \cos x| + C$
 (C) $\log |\sin x - \cos x| + C$ (D) $\frac{1}{(\sin x + \cos x)^2}$

हल :
$$\begin{aligned} \int \frac{\cos 2x}{(\sin x + \cos x)^2} dx &= \int \frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{(\cos x + \sin x)^2} dx \\ &= \int \frac{(\cos x + \sin x)(\cos x - \sin x)}{(\cos x + \sin x)^2} dx \\ &= \int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx \\ &= \int \frac{dt}{t} = \log |t| + C = \log |\sin x + \cos x| + C \end{aligned}$$

मान लीजिए $\cos x + \sin x = t$ हो, तब $-\sin x + \cos x dx = dt$

अतः विकल्प (B) सही है।

उत्तर

प्रश्न 43. यदि $f(a+b-x) = f(x)$, तो $\int_a^b xf(x) dx$ बराबर है :

- (A) $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(b-x) dx$ (B) $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(b+x) dx$
 (C) $\frac{b-a}{2} \int_a^b f(x) dx$ (D) $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$

हल : मान लीजिए

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b xf(x) dx \\ &= \int_a^b (a+b-x)f(a+b-x) dx \\ &\quad \left[\because \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx \right] \end{aligned}$$

$$= \int_a^b f(a+b-x)f(x) dx$$

$$I = \int_a^b [(a+b)f(x) - xf(x)] dx$$

$$= (a+b) \int_a^b f(x) dx - \int_a^b xf(x) dx$$

$$= (a+b) \int_a^b f(x) dx - I$$

$$2I = (a+b) \int_a^b f(x) dx$$

$$I = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$$

अतः विकल्प (D) सही है।

उत्तर

प्रश्न 44. $\int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{2x-1}{1+x-x^2} \right) dx$ का मान है :

हल : मान लीजिए

$$\begin{aligned}
 I &= \int_0^1 \tan^{-1} \left(\frac{2x-1}{1+x-x^2} \right) dx = \int_0^1 \tan^{-1} \left[\frac{x+(x-1)}{1-x(x-1)} \right] \\
 &= \int_0^1 \left[\tan^{-1} x + \tan^{-1}(x-1) \right] dx \quad \dots(i)
 \end{aligned}$$

$$= \int_0^1 [\tan^{-1}(1-x) + \tan^{-1}(1-x-1)] dx$$

$$\left[\because \int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx \right]$$


समीकरण (i) तथा (ii) को जोड़ने पर,

अतः विकल्प (B) सही है।

$$\left[\because \int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx \right]$$

... (ii)

३८४





Durga Tutorial

Online Classes

Thank You For Downloading Notes

ज्यादा जानकारी के लिए हमें
Social Media पर Follow करें।



https://www.facebook.com/durgatutorial23/?modal=admin_todo_tour



<https://twitter.com/DurgaTutorial>



<https://www.instagram.com/durgatutorial/>



<https://www.youtube.com/channel/UC5AJcz6Oizfohqj7eZvgeHQ>



9973735511